

CONSTANTES

Constante de Avogadro	= $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday (F)	= $9,65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J} \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Volume molar de gás ideal	= $22,4 \text{ L (CNTP)}$
Carga elementar	= $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante dos gases (R)	= $8,21 \times 10^{-2} \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 62,4 \text{ mmHg} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Constante gravitacional (g)	= $9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

DEFINIÇÕES

Pressão de 1 atm = 760 mmHg = $101\,325 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} = 760 \text{ Torr}$

$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$; $1 \text{ pm} = 1 \times 10^{-12} \text{ m}$; $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0°C e 760 mmHg

Condições ambientes: 25°C e 1 atm

Condições-padrão: 25°C e 1 atm ; concentração das soluções = $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (l) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (CM) = circuito metálico. ($conc$) = concentrado.

(ua) = unidades arbitrárias. [A] = concentração da espécie química A em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

MASSAS MOLARES

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
H	1	1,01	Ti	22	47,87
B	5	10,81	Cr	24	52,00
C	6	12,01	Ni	28	58,69
N	7	14,01	Cu	29	63,55
O	8	16,00	Zn	30	65,38
F	9	19,00	As	33	74,92
Na	11	22,99	Se	34	78,96
Mg	12	24,31	Ag	47	107,90
Al	13	26,98	Sn	50	118,70
P	15	30,97	Te	52	127,60
S	16	32,07	I	53	126,90
Cl	17	35,45	Xe	54	131,30
Ar	18	39,95	Au	79	197,00
K	19	39,10	U	92	238,00

Questão 1. Metanol (CH_3OH) e água deuterada (D_2O) são misturados numa razão volumétrica de 7:3, respectivamente, nas condições ambientes. A respeito dessa mistura, são feitas as seguintes afirmações:

- I. Imediatamente após a mistura das duas substâncias é observada uma fase única.
- II. Após o equilíbrio, observa-se uma fase única que contém as seguintes substâncias: CH_3OH , D_2O , CH_3OD e HOD .
- III. Se for adicionado um cubo de $\text{D}_2\text{O}(s)$ à mistura, este flutuará na superfície da mistura líquida.

Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| A () Apenas I | B () Apenas I e II | C () Apenas II |
| D () Apenas III | E () Todas | |

Questão 2. Considere os seguintes compostos:

- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| I. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ | II. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ | III. HCl |
| IV. H_3PO_4 | V. POCl_3 | |

Assinale a opção que contém os produtos que podem ser formados pela reação de ácido acético com pentacloreto de fósforo.

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| A () Apenas I, III e IV | B () Apenas I e IV | C () Apenas II e III |
| D () Apenas II e V | E () Apenas III e V | |

Questão 3. Nas condições ambientes são feitas as seguintes afirmações sobre o ácido tartárico:

- I. É um sólido cristalino.
- II. É solúvel em tetracloreto de carbono.
- III. É um ácido monoprótico quando em solução aquosa.
- IV. Combina-se com íons metálicos quando em solução aquosa.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S) apenas

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| A () I e II. | B () I e IV. | C () II e III. |
| D () III e IV. | E () IV. | |

Questão 4. Considere que 1 mol de uma substância sólida está em equilíbrio com seu respectivo líquido na temperatura de fusão de -183°C e a 1 atm. Sabendo que a variação de entalpia de fusão dessa substância é $6,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, assinale a opção que apresenta a variação de entropia, em $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A () - 20 | B () - 33 | C () + 50 | D () + 67 | E () + 100 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

Questão 5. Assinale a opção que contém o(s) produto(s) formado(s) durante o aquecimento de uma mistura de Cu_2O e Cu_2S , em atmosfera inerte.

- | | | |
|--|--|--|
| A () CuSO_4 | B () Cu_2SO_3 | C () Cu e SO_2 |
| D () Cu e SO_3 | E () CuO e CuS | |

Questão 6. Assinale a opção que contém o momento angular do elétron na 5ª órbita do átomo de hidrogênio, segundo o modelo atômico de Bohr.

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| A () $h/2\pi$ | B () h/π | C () $2,5 h/2\pi$ |
| D () $2,5 h/\pi$ | E () $5 h/\pi$ | |

Questão 7. Assinale a opção que contém a base conjugada de OH^- .

- A () O^{2-} B () O^- C () O_2^- D () H_2O E () H^+

Questão 8. Assinale a opção que contém o número de oxidação do crômio no composto $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$.

- A () Zero B () +1 C () +2 D () +3 E () +4

Questão 9. Assinale a opção que apresenta o elemento químico com o número CORRETO de nêutrons.

- A () ${}^{19}_9\text{F}$ tem zero nêutrons. B () ${}^{24}_{12}\text{Mg}$ tem 24 nêutrons.
 C () ${}^{197}_{79}\text{Au}$ tem 79 nêutrons. D () ${}^{75}_{33}\text{As}$ tem 108 nêutrons.
 E () ${}^{238}_{92}\text{U}$ tem 146 nêutrons.

Questão 10. A pressão de vapor de uma solução ideal contendo um soluto não-volátil dissolvido é diretamente proporcional à

- A () fração molar do soluto.
 B () fração molar do solvente.
 C () pressão osmótica do soluto.
 D () molaridade, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, do solvente.
 E () molalidade, em $\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$, do solvente.

Questão 11. Considere um mol de um gás que se comporta idealmente, contido em um cilindro indeformável provido de pistão de massa desprezível, que se move sem atrito. Com relação a este sistema, são feitas as seguintes afirmações:

- I. Se o gás for resfriado contra pressão externa constante, o sistema contrai-se.
 II. Se pressão for exercida sobre o pistão, a velocidade média das moléculas do gás aumenta.
 III. Se o sistema for aquecido a volume constante, a velocidade média das moléculas aumenta, independentemente da natureza do gás.
 IV. A velocidade média das moléculas será maior se o gás for o xenônio e menor se for o argônio.

Das afirmações acima, está(ão) ERRADA(S) apenas

- A () I e II. B () I, III e IV. C () II e III.
 D () II e IV. E () IV.

Questão 12. Considere três cubos maciços de 2 cm de aresta, constituídos, respectivamente, de Cr, Ni e Ti puros. Os três cubos são aquecidos até 80°C e cada cubo é introduzido em um béquer contendo 50 g de água a 10°C . Com base nas informações constantes da tabela abaixo, assinale a opção que apresenta a relação CORRETA entre as temperaturas dos cubos, quando o conteúdo de cada béquer atingir o equilíbrio térmico.

Substância	Massa específica ($\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)	Calor específico ($\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
H_2O	1,00	4,18
Ti	4,54	0,52
Cr	7,18	0,45
Ni	8,90	0,44

- A () $T_{\text{Cr}} > T_{\text{Ni}} > T_{\text{Ti}}$. B () $T_{\text{Ni}} = T_{\text{Ti}} > T_{\text{Cr}}$. C () $T_{\text{Ni}} > T_{\text{Cr}} > T_{\text{Ti}}$.
 D () $T_{\text{Ti}} > T_{\text{Cr}} > T_{\text{Ni}}$. E () $T_{\text{Ti}} > T_{\text{Cr}} = T_{\text{Ni}}$.


Questão 18. Considere os seguintes compostos:

- I. álcoois II. aldeídos III. carbono particulado (negro de fumo) IV. cetonas

Dos componentes acima, é (são) produto(s) da combustão incompleta do n-octano com ar atmosférico apenas

- A () I e II. B () I e IV. C () II e III.
D () III. E () IV.

Questão 19. Considere a reação do tetraborato de sódio:



Em relação ao produto da reação $\text{B}(\text{OH})_3$ são feitas as seguintes afirmações:

- I. $\text{B}(\text{OH})_3$ é um ácido de Brønsted – Lorry.
II. $\text{B}(\text{OH})_3$ é uma base de Arrhenius.
III. O produto da primeira ionização do $\text{B}(\text{OH})_3(aq)$ é o $\text{BO}(\text{OH})_2^-(aq)$.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S) apenas

- A () I. B () I e III. C () II. D () II e III. E () III.

Questão 20. Considere uma célula a combustível alcalina (hidrogênio-oxigênio) sobre a qual são feitas as seguintes afirmações:

- I. Sob condição de consumo de carga elétrica, a voltagem efetiva de serviço desse dispositivo eletroquímico é menor que a força eletromotriz da célula.
II. O combustível (hidrogênio gasoso) é injetado no compartimento do anodo e um fluxo de oxigênio gasoso alimenta o catodo dessa célula eletroquímica.
III. Sendo o potencial padrão dessa célula galvânica igual a $1,229 \text{ V}_{\text{EPH}}$ (volt na escala padrão do hidrogênio), a variação de energia livre de Gibbs padrão (ΔG°) da reação global do sistema redox atuante é igual a $-237,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S) apenas

- A () I. B () I, II e III. C () I e III. D () II. E () II e III.

AS QUESTÕES DISSERTATIVAS, NUMERADAS DE 21 A 30, DEVEM SER RESPONDIDAS NO CADERNO DE SOLUÇÕES.

AS QUESTÕES NUMÉRICAS DEVEM SER DESENVOLVIDAS ATÉ O FINAL, COM APRESENTAÇÃO DO VALOR ABSOLUTO DO RESULTADO.

Questão 21. O dióxido de potássio tem várias aplicações, entre as quais, a

- (a) produção de peróxido de hidrogênio (g) na presença de água.
(b) conversão de dióxido de carbono (g) para oxigênio (g).
(c) absorção de dióxido de carbono (g) na presença de H_2O com formação de oxigênio (g).


Apresente as equações químicas balanceadas que representam as reações descritas nos itens acima.

Questão 22. São descritos dois experimentos:

- I. Ovo cozido em água fervente teve sua casca quebrada, de modo que parte de sua clara permaneceu em contato com esta água, na qual a seguir foi também imerso um objeto polido de prata. Após um certo período de tempo, observou-se o escurecimento desse objeto, que foi retirado da água e lavado.
- II. Em um béquer, foi aquecida água até a fervura e adicionada uma colher das de sopa de cloreto de sódio. A seguir, esta solução foi transferida para um béquer revestido com papel alumínio. O objeto de prata utilizado no experimento I foi então imerso nesta solução e retirado após alguns minutos.

Em relação a esses experimentos:

- (a) apresente a equação global que representa a reação química ocorrida na superfície do objeto de prata no experimento I e calcule a diferença de potencial elétrico da reação química.
- (b) preveja a aparência do objeto de prata após a realização do segundo experimento.
- (c) apresente a equação global da reação química envolvida no experimento II e sua diferença de potencial elétrico.



Questão 23. Apresente as equações que representam as reações químicas de nitração do tolueno, na presença de ácido sulfúrico, levando a seus isômeros. Indique o percentual de ocorrência de cada isômero e seus respectivos estados físicos, nas condições-padrão.

Questão 24. Escreva a reação de combustão completa de um hidrocarboneto genérico ($\text{C}_\alpha\text{H}_\beta$) com ar atmosférico. Considere a presença do nitrogênio gasoso no balanço estequiométrico da reação e expresse os coeficientes estequiométricos dessa reação em função de α e β .

Questão 25. Em um processo de eletrodeposição, níquel metálico é eletrodepositado no catodo de uma célula eletrolítica e permanece coeso e aderido a esse eletrodo. Sabendo que a massa específica do níquel metálico ($\rho_{\text{Ni},25^\circ\text{C}}$) é igual a $8,9 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ e que a espessura total da camada eletrodepositada, medida no final do processo, foi de $2,0 \times 10^{-6} \text{ m}$, calcule a densidade de corrente aplicada (admitida constante), expressa em $\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$, considerando nesse processo uma eficiência de corrente de eletrodeposição de 100% e um tempo de operação total de 900 s.

Questão 26. Água líquida neutra ($\text{pH} = 7,0$), inicialmente isenta de espécies químicas dissolvidas, é mantida em um recipiente de vidro aberto e em contato com a atmosfera ambiente sob temperatura constante. Admitindo-se que a pressão parcial do oxigênio atmosférico seja igual a 0,2 atm e sabendo-se que esse gás é solúvel em $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ e que o sistema está em equilíbrio à temperatura de 25°C , pedem-se:

- (a) escrever a equação química balanceada da semirreação que representa o processo de redução de oxigênio gasoso em meio de água líquida neutra e aerada.
- (b) determinar o potencial de eletrodo (V_{EPH}), à temperatura de 25°C , da semirreação obtida no item (a), considerando as condições estabelecidas no enunciado desta questão.
- (c) determinar o valor numérico, expresso em $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, da variação de energia livre de Gibbs padrão (ΔG°) da semirreação eletroquímica do item (a).



Questão 27. Considere uma mistura gasosa constituída de C_3H_8 , CO e CH_4 . A combustão, em excesso de oxigênio, de 50 mL dessa mistura gasosa forneceu 70 mL de $CO_2(g)$. Determine o valor numérico do percentual de C_3H_8 na mistura gasosa.

Questão 28. O ácido nítrico reage com metais, podendo liberar os seguintes produtos: NO (que pode ser posteriormente oxidado na presença do ar), N_2O , NO_2 ou NH_3 (que reage posteriormente com HNO_3 , formando NH_4NO_3). A formação desses produtos depende da concentração do ácido, da natureza do metal e da temperatura da reação.

Escreva qual(is) dos produtos citados acima é(são) formado(s) nas seguintes condições:

- (a) $Zn(s) + HNO_3$ muito diluído (~2%)
- (b) $Zn(s) + HNO_3$ diluído (~10%)
- (c) $Zn(s) + HNO_3$ concentrado
- (d) $Sn(s) + HNO_3$ diluído
- (e) $Sn(s) + HNO_3$ concentrado

Questão 29. Considere os seguintes dados:

Entalpia de vaporização da água a 25 °C: $\Delta_{vap}H = 44 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Massa específica da água a 25 °C: $\rho_{H_2O} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

Temperaturas de ebulição a 1 bar:

$$T_{eb,H_2O} = 100^\circ\text{C}; T_{eb,H_2S} = -60^\circ\text{C}; T_{eb,H_2Se} = -41^\circ\text{C} \text{ e } T_{eb,H_2Te} = -2^\circ\text{C}$$

Com base nestas informações:

- (a) determine o valor numérico da energia liberada, em J, durante a precipitação pluviométrica de 20 mm de chuva sobre uma área de $(10 \times 10) \text{ km}^2$.
- (b) justifique, em termos moleculares, por que H_2O apresenta T_{eb} muito maior que outros calcogenetos de hidrogênio.
- (c) como se relaciona, em termos moleculares, a elevada T_{eb,H_2O} com a quantidade de energia liberada durante uma precipitação pluviométrica?

Questão 30. Velocidades iniciais (v_i) de decomposição de peróxido de hidrogênio foram determinadas em três experimentos (A, B e C), conduzidos na presença de $I^-(aq)$ sob as mesmas condições, mas com diferentes concentrações iniciais de peróxido ($[H_2O_2]_i$), de acordo com os dados abaixo:

Experimento	$[H_2O_2]_i$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	v_i ($10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)
A	0,750	2,745
B	0,500	1,830
C	0,250	0,915

Com base nestes dados, para a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio:

- (a) escreva a equação estequiométrica que representa a reação.
- (b) indique a ordem desta reação.
- (c) escreva a lei de velocidade da reação.
- (d) determine o valor numérico da constante de velocidade, k.
- (e) indique a função do $I^-(aq)$ na reação.