

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO
DE SAÚDE DA MARINHA / CP-CSM/2013)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

- 1) A nutrição parenteral (NP) é uma forma de suporte nutricional especializada administrada por via intravenosa. Um método utilizado para diminuir custos na preparação é a adição de emulsão lipídica à NP. A fim de evitar o êmbolo de gordura durante a infusão da NP, que cuidado de Enfermagem deve ser realizado?
- (A) Trocar o equipo e o filtro a cada 72 horas.
 - (B) Infundir a NP a uma velocidade de 40 a 60 ml/hora.
 - (C) Monitorar os níveis glicêmicos.
 - (D) Inspeccionar a solução.
 - (E) Manter o paciente em decúbito lateral esquerdo.
- 2) Segundo Potter e Perry (2009), a hierarquia das necessidades de Maslow é uma teoria útil para designar prioridades nos cuidados de Enfermagem. Considerando essa teoria, um paciente que deu entrada na emergência com dispneia necessita de atendimento em qual nível de prioridade?
- (A) Primeiro.
 - (B) Segundo.
 - (C) Terceiro.
 - (D) Quarto.
 - (E) Quinto.
- 3) O enfermeiro, atendendo às necessidades da equipe de Enfermagem, pode assumir um estilo de liderança democrático e participativo. De acordo com Kurcgant (2006), em relação à liderança democrática, é correto afirmar que
- (A) é adequada para líderes que são técnica ou profissionalmente inseguros.
 - (B) tem o compromisso com a produção e com os aspectos técnicos do trabalho.
 - (C) desenvolve a interação grupal, de modo que a produção é quantitativamente maior do que a de grupos autocráticos.
 - (D) direciona as críticas aos subordinados de forma pessoal.
 - (E) verifica-se a transferência de poder e de influência para outros membros do grupo.

- 4) A BCG compõe o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, sendo administrada nos primeiros dias de vida. Com relação a essa vacina, é INCORRETO afirmar que
- (A) ela é indicada principalmente para prevenir as formas graves da tuberculose.
 - (B) a via de administração é rigorosamente intradérmica.
 - (C) a vacina inativa-se quando exposta diretamente aos raios solares ou à luz artificial.
 - (D) ela deve ser utilizada no prazo máximo de 6 horas após a reconstituição.
 - (E) recomenda-se adiar a vacinação em recém-nascidos com peso inferior a 2000 g.
- 5) Com relação aos aspectos ligados ao processo de saúde/doença mental da mulher, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale, a seguir, a opção correta.
- () Pseudociese é o desenvolvimento dos sintomas clássicos da gravidez (amenorreia, náusea, aumento e pigmentação das mamas), ainda que a mulher não esteja grávida.
 - () Os anticonvulsivantes podem ser utilizados pelas gestantes, pois não são teratogênicos.
 - () Pica é a ingestão repetida de substâncias não-nutritivas como areia, argila, terra, que pode acontecer em mulheres grávidas.
 - () A eletroconvulsoterapia pode ser uma alternativa para o tratamento psiquiátrico de mulheres grávidas que não podem tomar medicamentos.
- (A) (V) (F) (V) (V)
(B) (F) (V) (V) (F)
(C) (V) (V) (F) (V)
(D) (F) (V) (F) (F)
(E) (V) (F) (V) (F)

- 6) Sabendo que um paciente com diagnóstico de colite ulcerativa está em terapia enteral, qual é a medida de prevenção que deverá ser adotada pelo enfermeiro com o objetivo de minimizar os sintomas da síndrome do esvaziamento gástrico?
- (A) Administrar a alimentação em bólus para evitar a distensão súbita do intestino.
 - (B) Aumentar a velocidade de instilação da fórmula para otimizar a metabolização dos carboidratos e eletrólitos.
 - (C) Aquecer a primeira dieta enteral, mantendo temperatura morna para estimular a peristalse.
 - (D) Instilar a quantidade mínima de água necessária para lavar a sonda antes e depois de uma alimentação.
 - (E) Administrar medicamentos antieméticos misturados com a fórmula para garantir absorção.
- 7) A violência contra a mulher é um fenômeno universal que atinge classes de diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social. Com relação às medidas adotadas no atendimento à mulher vítima de violência sexual, assinale a opção correta.
- (A) O boletim de ocorrência deve ser apresentado pela vítima ao procurar atendimento hospitalar, sob a condição de impedimento dos profissionais de prestar assistência.
 - (B) Caso não seja possível a realização dos exames periciais no IML, os médicos legistas poderão valer-se dos dados registrados em prontuário médico.
 - (C) Nos casos em que o estupro resultar em gravidez, o aborto é permitido por lei somente após à 20ª semana de gestação.
 - (D) Os casos de violência sexual contra a mulher são considerados de notificação compulsória, somente em situações que envolvam menores de 18 anos de idade.
 - (E) A coleta de material para identificação do agressor deve ser realizada do conteúdo vaginal, anal ou oral, conservando a amostra por meio de fixadores.

- 8) A hanseníase ainda constitui relevante problema de saúde pública nacional. Com relação a essa doença, é correto afirmar que
- (A) a gravidez e o aleitamento materno contraindicam o tratamento com a poliquimioterapia.
 - (B) os pacientes paucibacilares não transmitem a infecção.
 - (C) a vacina BCG é contraindicada para contatos assintomáticos.
 - (D) o resultado negativo da baciloscopia exclui diagnóstico de hanseníase.
 - (E) o tratamento farmacológico não difere entre casos paucibacilares e multibacilares.
- 9) O método comumente utilizado para avaliar o ajuste imediato do recém-nascido à vida extrauterina é o índice de Apgar. Com relação a esse índice, é correto afirmar que
- (A) é baseado na observação da frequência cardíaca, do esforço respiratório, do tônus muscular, da temperatura corpórea, da irritabilidade reflexa e da cor da pele.
 - (B) reflete as condições gerais do lactente no primeiro e no quinto minuto após o nascimento.
 - (C) é utilizado para determinar se existe ou não a necessidade de se realizar ressuscitação neonatal.
 - (D) é afetado pelo grau de imaturidade fisiológica, malformação congênita e peso do lactente ao nascer.
 - (E) serve para predizer eventos futuros relacionados ao estado neurológico e fisiológico atual do lactente.
- 10) Segundo Kaplan e Sadock (2007), a encefalopatia de Wernicke apresenta-se em geral com a seguinte tríade: ataxia, oftalmoplegia e confusão mental. A causa dessa encefalopatia está relacionada a qual deficiência nutricional?
- (A) Vitamina B12.
 - (B) Tiamina.
 - (C) Folato.
 - (D) Vitamina B3.
 - (E) Potássio.

- 11) Segundo Malagutti (2011), na sala de recuperação anestésica, podem ser utilizadas escalas para a evolução do pós-operatório imediato. Dentre elas, há o índice de Aldrete e Kroulik, que apresenta os seguintes itens de avaliação:
- (A) atividade, respiração, consciência, circulação e SPO2.
 - (B) nível de sedação, temperatura axilar, dor e atividade.
 - (C) consciência, orientação, SPO2, respiração e atividade.
 - (D) respiração, circulação, dor, SPO2 e temperatura axilar.
 - (E) nível de sedação, resposta aos estímulos, circulação e dor.
- 12) Segundo Brunner e Suddarth(2011), na administração da terapia trombolítica, o sangramento é uma das contraindicações absolutas. Assinale a opção que apresenta três sinais e sintomas do sangramento.
- (A) Diminuição do hematócrito, diminuição na pressão arterial e dor nas costas.
 - (B) Fraqueza muscular, cefaleia, e taquipneia.
 - (C) Abaulamento nos sítios de procedimentos invasivos, dor nas costas e rubor.
 - (D) Diminuição da hemoglobina, aumento da frequência cardíaca e formigamento nas mãos.
 - (E) Alteração do nível de consciência, diminuição do hematócrito e náuseas.
- 13) As úlceras causadas por insuficiência venosa diferem daquelas decorrentes da insuficiência arterial. Com relação às úlceras venosas, é correto afirmar que
- (A) localizam-se, com frequência, no terço inferior da perna.
 - (B) apresentam margens bem definidas.
 - (C) a pele circundante é seca e não apresenta exsudato.
 - (D) é extremamente dolorosa.
 - (E) o pulso pedial está ausente.
- 14) A esplenectomia é um tratamento alternativo para pacientes portadores de púrpura trombocitopênica idiopática. Com o objetivo de evitar a sepse, com quais vacinas esses pacientes devem ser imunizados no pré-operatório?
- (A) Pneumocócica, BCG intradérmica e antitetânica.
 - (B) Meningocócica, varicela e Haemophilus influenza B.
 - (C) Haemophilus influenza B, pneumocócica e meningocócica.
 - (D) Meningocócica, pneumocócica e febre amarela.
 - (E) Febre amarela, Haemophilus influenza B e antitetânica.

- 15) Um paciente idoso cuja queixa principal seja a dor lombar e que apresenta um nível de proteína total elevado, deve ser avaliado para qual diagnóstico?
- (A) Infarto agudo do miocárdio.
 - (B) Púrpura trombocitopênica.
 - (C) Policitemia.
 - (D) Síndrome mielodisplásica.
 - (E) Mieloma múltiplo.
- 16) Segundo Chaves e Posso (2012), existem várias escalas validadas que podem ser utilizadas para direcionar a eficiência da marcha e do equilíbrio. A prova com sinal positivo que demarca o risco real para quedas é denominada prova de
- (A) Budzinki.
 - (B) Trousseau.
 - (C) Laségue.
 - (D) Romberg.
 - (E) Kerning.
- 17) Um paciente com sinais e sintomas de congestão pulmonar deu entrada no Serviço de Emergência de um hospital. Ao exame físico, esse paciente apresentava confusão, tontura, dor de cabeça, pele quente e ruborizada. Após colher gasometria arterial, o resultado mostrou: pH < 7,35, PaCO₂ > 45 mmHg, PaO₂ < 80 mmHg e nível de bicarbonato de 22 mEq/l. Esse resultado está relacionado a qual desequilíbrio acidobásico?
- (A) Alcalose metabólica.
 - (B) Acidose respiratória.
 - (C) Alcalose respiratória.
 - (D) Acidose metabólica.
 - (E) Alcalose mista.

- 18) Segundo Brunner e Suddarth (2011), o traumatismo craniano (TC) possui uma classificação ampla, que inclui a lesão do couro cabeludo, do crânio e do cérebro. Com relação ao TC, assinale a opção correta.
- (A) Os hematomas subgaleais são de difícil absorção e, por isso, exigem tratamentos específicos.
 - (B) Suspeita-se de fratura de base de crânio quando o líquido cefalorraquidiano extravasa pelas orelhas e nariz.
 - (C) O controle da Pressão Intra Craniana (PIC) inclui manter a pressão de perfusão cerebral ≥ 50 mmHg.
 - (D) Os benzodiazepínicos são contraindicados após o traumatismo craniano, pois eles afetam a PIC.
 - (E) A escala de coma de Glasgow é um instrumento de avaliação da resposta do paciente aos estímulos, e seus escores variam de 5 a 15.
- 19) O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é consequência de um distúrbio na resposta imune. Segundo Brunner e Suddarth (2011), com relação ao LES, é correto afirmar que
- (A) a doença pode ser induzida por substâncias químicas ou por fármacos.
 - (B) a doença não compromete o sistema cardiovascular.
 - (C) o comprometimento articular é frequentemente assimétrico.
 - (D) a exposição solar é indicada para melhorar a lesão cutânea aguda.
 - (E) a doença tem maior incidência no sexo masculino.
- 20) Segundo Oguisso (2012), com relação às questões ético-legais envolvendo a pesquisa em Enfermagem, assinale a opção correta.
- (A) Em algumas situações, os sujeitos não têm condições de decidir sobre a participação na pesquisa, ficando a cargo do pesquisador.
 - (B) O sujeito não pode recusar-se a responder perguntas após autorizada a sua participação no estudo.
 - (C) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido serve para a divulgação dos dados, não sendo necessário na fase de coleta.
 - (D) Os sujeitos potenciais de uma pesquisa têm o direito de não sofrer danos por sua participação no estudo.
 - (E) Após o início da pesquisa, o sujeito não tem direito de desistir sem que seja atingido o objetivo final do estudo.

- 21) O abortamento espontâneo recebe diferentes denominações de acordo com características específicas. Com relação ao abortamento espontâneo é correto classificá-lo como
- (A) precoce quando ocorre entre a 13^a e 22^a semanas de gestação.
 - (B) incompleto na presença de concepto morto ou na ausência de saco embrionário.
 - (C) evitável na presença de saco embrionário íntegro e/ou concepto vivo.
 - (D) retido quando há presença de restos ovulares.
 - (E) tardio quando ocorre após a 24^a semana de gestação.
- 22) Segundo Kaplan e Sadock (2007), a síndrome neuroléptica maligna é uma complicação do tratamento com antipsicótico, a qual representa risco à vida. São sinais e sintomas dessa síndrome, EXCETO:
- (A) Febre alta.
 - (B) Aumento da frequência cardíaca.
 - (C) Sudorese.
 - (D) Delirium tremens.
 - (E) Aumento da pressão arterial.
- 23) O tratamento de certas doenças que interferem no trânsito de fezes pelo reto resulta em desvio fecal temporário ou permanente. Com o intuito de estabelecer um diagnóstico de Enfermagem, é correto afirmar que
- (A) a medição do estoma é importante a cada troca da bolsa.
 - (B) a adição de aspirina dentro da bolsa de ostomia é indicada porque controla os odores.
 - (C) a troca da bolsa de ostomia é mais confortável depois das refeições.
 - (D) o dano químico ao redor da ostomia é devido à remoção abrupta da bolsa.
 - (E) a higienização da ostomia é realizada com água morna e sabão.

- 24) Segundo Kaplan e Sadock (2007), o medo de ficar só em lugares públicos, particularmente naqueles em que seria difícil sair rapidamente durante um ataque de pânico, é característico de qual quadro psiquiátrico?
- (A) Transtorno de pânico.
 - (B) Fobia social.
 - (C) Transtorno de estresse agudo.
 - (D) Agorafobia.
 - (E) Claustrofobia.
- 25) Segundo Brunner e Suddarth (2011), o choque se caracteriza pela perfusão tissular inadequada que, quando não tratada, pode resultar na morte celular. Com relação ao choque, assinale a opção correta.
- (A) O lactato de ringer é uma solução eletrolítica de ácido láctico, e pode ser utilizado no choque.
 - (B) A epinefrina é utilizada no choque com o intuito de melhorar a contratilidade e de reduzir a demanda de O₂ do coração.
 - (C) Posicionar o paciente em posição de Trendelenburg plena é recomendado no choque hipovolêmico.
 - (D) A dextrana não é indicada quando a causa do choque hipovolêmico é a hemorragia.
 - (E) Quando a pressão arterial média fica acima de 80mmHg, ocorrem alterações drásticas na função renal.

- 26) A transgressão de algum dos artigos relacionados ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem implica a aplicação de penalidades. Com relação à responsabilidade de aplicação das penalidades, é correto afirmar que
- (A) a advertência verbal, a multa, a censura e a suspensão do exercício profissional são da alçada do Conselho Federal de Enfermagem.
 - (B) as infrações que tiverem origem no Conselho Federal de Enfermagem terão como instância superior a Assembleia dos Delegados Regionais.
 - (C) a advertência verbal e a multa são da alçada do diretor da instituição hospitalar.
 - (D) a suspensão do exercício profissional e a cassação do direito ao exercício profissional são de competência do Conselho Regional de Enfermagem.
 - (E) as infrações que tiverem origem no Conselho Federal de Enfermagem terão como instância superior o Superior Tribunal de Justiça.
- 27) O cuidado de Enfermagem com um paciente durante uma crise convulsiva deve ser baseado em diferentes atitudes, EXCETO:
- (A) afrouxar roupas apertadas e monitorar o tempo da convulsão.
 - (B) prover ambiente seguro e auxiliar na contenção.
 - (C) permitir que a convulsão termine e não oferecer líquido.
 - (D) proporcionar privacidade e afastar curiosos.
 - (E) posicionar em decúbito lateral e remover óculos.

- 28) Os pacientes submetidos ao tratamento dialítico precisam adotar restrições no aporte nutricional. Segundo Brunner e Suddarth (2011), em relação à terapia nutricional adequada para os pacientes portadores de insuficiência renal, é correto afirmar que
- (A) as proteínas de alto valor biológico são permitidas por serem necessárias ao crescimento e ao reparo celular.
 - (B) alimentos ricos em carboidratos e lipídios não devem ser incentivados, para evitar o ganho de peso interdialítico.
 - (C) a restrição de líquidos por via oral é imperativa, e independe do volume de líquido administrado por via venosa.
 - (D) a suplementação de vitaminas não é necessária, visto que o paciente não perde vitaminas durante a terapia dialítica.
 - (E) deve-se estimular uma dieta rica em potássio, visando a prevenir as perdas desse componente durante a diálise.
- 29) Segundo Brunner e Suddarth (2011), no tratamento medicamentoso da diverticulite aguda, o enfermeiro deve estar atento às medicações utilizadas. Que medicação é contraindicada por aumentar a pressão intraluminal do cólon?
- (A) Antibióticos.
 - (B) Meperidina.
 - (C) Morfina.
 - (D) Metamucil.
 - (E) Antiespasmódicos.

- 30) O câncer de mama, nos países ocidentais, representa uma das principais causas de morte entre as mulheres. Segundo Brunner e Suddarth (2011), assinale a opção correta em relação ao câncer de mama.
- (A) A reconstrução mamária não é considerada um componente do tratamento cirúrgico do câncer de mama.
 - (B) A biópsia excisional é realizada quando é preciso apenas uma amostra do tecido afetado, não sendo necessária a remoção da lesão em sua totalidade.
 - (C) Mesmo quando o linfonodo sentinela é negativo para o câncer de mama metastático, é necessária dissecação axilar.
 - (D) O nódulo do tumor maligno de mama geralmente é múltiplo, fixo e possui formato regular.
 - (E) Um cuidado de Enfermagem pós-biópsia de mama é encorajar o uso imediato de sutiã de sustentação após o procedimento.
- 31) A paracentese é a remoção de líquido da cavidade peritoneal. Com relação às orientações para realização desse procedimento, é correto afirmar que
- (A) o paciente não pode urinar, mantendo a bexiga facilmente palpável, o que diminui o risco de punção inadvertida desse órgão.
 - (B) o paciente deve ser posicionado de maneira ereta na borda do leito ou em uma cadeira, e em Fowler quando acamado.
 - (C) a técnica de punção não precisa obedecer aos critérios de assepsia, visto que a cavidade abdominal é uma região contaminada.
 - (D) a pressão arterial deve ser monitorada durante o procedimento, pois é comum ocorrer aumento da pressão arterial no momento da drenagem do líquido da cavidade abdominal.
 - (E) os sinais de choque vascular: rubor facial, sudorese e diminuição da frequência do pulso, devem ser rigorosamente monitorados.

- 32) Com relação ao aleitamento materno por gestantes portadoras do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), assinale a opção correta.
- (A) O risco de transmissão do HIV pelo leite materno é baixo e reduz a cada mamada.
 - (B) A transmissão do vírus do HIV ocorre somente para recém-nascidos de puérperas sintomáticas ou que não fazem uso de terapia antirretroviral.
 - (C) Após o parto, a lactação deverá ser contraindicada, havendo possibilidade de administração de medicamentos inibidores de lactação, porém o enfaixamento das mamas não é indicado.
 - (D) A amamentação cruzada - aleitamento do recém-nascido por outra nutriz - está formalmente autorizada.
 - (E) Quando, por falta de informação, o aleitamento materno tiver sido iniciado, orienta-se interromper a amamentação o mais rápido possível.
- 33) A lavagem das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação de infecções no ambiente hospitalar. Com relação à higienização das mãos, é correto afirmar que
- (A) na higienização das mãos com água e sabão, a utilização de água quente potencializa a remoção de microrganismos.
 - (B) a higienização das mãos está indicada somente após a remoção das luvas.
 - (C) após a higienização das mãos, com preparação alcoólica, recomenda-se secá-las utilizando papel toalha.
 - (D) o uso da solução alcoólica pode substituir a lavagem das mãos com água e sabão quando não houver sujidade visível.
 - (E) a utilização de soluções hidratantes deve ser estimulada e disponibilizada para uso coletivo, nas unidades de saúde.

- 34) O botulismo alimentar é uma doença resultante da ação de uma potente neurotoxina que tem elevada letalidade. Com relação a essa patologia, é correto afirmar que
- (A) o quadro neurológico, propriamente dito, caracteriza-se por paralisia flácida aguda motora ascendente.
 - (B) a fraqueza muscular nos membros é tipicamente assimétrica, acometendo com maior intensidade os membros superiores.
 - (C) uma característica importante no quadro clínico é a perda imediata da consciência e o comprometimento da sensibilidade.
 - (D) a imunização é recomendada para a população em geral sob a forma de toxoide botulínico polivalente.
 - (E) o botulismo alimentar é de notificação compulsória, exigindo investigação imediata, pois um único caso é considerado surto e emergência de saúde pública.
- 35) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.
O número mínimo de consultas de pré-natal, por trimestre, preconizado para as gestantes assistidas pelas unidades de saúde integrantes do SUS é de _____ consultas, sendo, preferencialmente, _____ no primeiro trimestre, _____ no segundo trimestre e _____ no terceiro trimestre.
- (A) sete / uma / três / três
 - (B) seis / duas / duas / duas
 - (C) sete / uma / duas / quatro
 - (D) seis / uma / duas / três
 - (E) sete / duas / duas / três
- 36) Segundo Brunner e Suddarth (2011), os pacientes com queimaduras por eletricidade estão propensos à complicação de insuficiência renal aguda devido
- (A) à liberação da mioglobina.
 - (B) ao déficit de potássio.
 - (C) ao aumento do dióxido de carbono.
 - (D) ao déficit de sódio.
 - (E) ao transporte de cálcio.

- 37) No Brasil, a principal estratégia utilizada para a detecção e o rastreamento precoce do câncer do colo do útero é a realização do exame preventivo (ou exame de Papanicolaou). Com relação a esse procedimento, assinale a opção correta.
- (A) O exame preventivo está contraindicado para mulheres grávidas, assim como para mulheres que foram submetidas à histerectomia total ou subtotal.
 - (B) Recomenda-se não realizar exames intravaginais (como ultrassonografia) durante as 48 horas que antecedem a coleta.
 - (C) A coleta do exame preventivo em virgens deve ser realizada conforme a rotina de coleta desse exame em mulheres que já tiveram relações sexuais.
 - (D) O exame pode ser feito no período menstrual, não havendo prejuízo da qualidade da amostra nem do diagnóstico citopatológico.
 - (E) Recomenda-se o uso de duchas higiênicas vaginais antes da coleta.
- 38) A dengue é uma doença dinâmica que depende do reconhecimento precoce dos sinais e sintomas para evitar que o paciente evolua para um estágio mais grave. Com relação a essa doença, assinale a opção correta.
- (A) A transmissão se faz pela picada do macho do mosquito *Aedes aegypti*.
 - (B) Não é uma doença de notificação compulsória, mas sua investigação é obrigatória nos casos suspeitos de dengue hemorrágica.
 - (C) A primeira manifestação da dengue é a cefaleia, associada à dor retro-orbitária, adinamia, mialgias, artral-gias, com presença ou não de febre.
 - (D) Durante o exame físico, a prova do laço só deverá ser realizada nos casos suspeitos de dengue hemorrágica.
 - (E) As medidas de controle se restringem ao combate ao vetor, pois não há vacina ou drogas antivirais específicas.

- 39) Com relação ao acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS), é correto afirmar que
- (A) os sacos de acondicionamento devem ser constituídos de material impermeável, resistente à ruptura e ao vazamento, sendo permitido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
 - (B) os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, que resistam ao tombamento e que tenham tampa de abertura manual.
 - (C) os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa para vedação.
 - (D) os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes de material compatível com o líquido armazenado, rígidos, permeáveis, com tampa rosqueada e vedante.
 - (E) os resíduos escarificantes devem ser acondicionados, imediatamente após o uso, em saco branco leitoso, juntamente com os demais resíduos infectantes.
- 40) A escolha do método anticoncepcional durante a amamentação deve ser sempre personalizada. Analise as afirmativas a seguir com relação aos métodos anticoncepcionais durante esse período.
- I - O DIU pode ser inserido imediatamente após o parto.
 - II - Os métodos comportamentais - tabelinha, muco cervical, entre outros - só poderão ser usados após a regularização do ciclo menstrual.
 - III- A minipílula pode ser utilizada, durante a amamentação, a partir de 6 semanas após o parto.
 - IV - A amamentação exclusiva pode ser utilizada como método anticoncepcional, mesmo com o retorno da menstruação durante esse período.
 - V - O anticoncepcional injetável trimestral não pode ser utilizado em lactantes, pois interfere na qualidade e na quantidade do leite materno.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas IV e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

- 41) A medição e o registro pela equipe de Enfermagem, de toda ingestão e eliminação de líquidos durante o período de 24 horas são importantes para avaliação do equilíbrio hídrico do paciente. Com relação a esse controle, assinale a opção correta.
- (A) É uma avaliação para qualquer paciente cujo estado de saúde encontra-se em recuperação.
 - (B) Os líquidos IV e o sangue, ou os seus componentes, são registrados como vias de ganhos.
 - (C) A avaliação precisa do registro identifica apenas os distúrbios hidreletrolíticos.
 - (D) O registro não é realizado em pacientes confusos, desorientados e com problemas de alfabetização.
 - (E) A estimativa de registro somente é aceitável para a água utilizada na lavagem da sonda antes e após as medicações.
- 42) A pancreatite se caracteriza pela autodigestão do pâncreas por suas próprias enzimas. Assinale a opção que corresponde a um cuidado de Enfermagem aplicado aos pacientes com pancreatite aguda.
- (A) Manter o paciente em posição semi-Fowler para aumentar a expansão torácica, prejudicada pela distensão abdominal.
 - (B) Estimular a ingestão oral de líquidos e alimentos leves para compensar as perdas nutricionais provocadas por vômitos frequentes.
 - (C) Não realizar sondagem nasogástrica, pois há o risco de sangramento em consequência do estado inflamatório do trato digestivo.
 - (D) Estimular o paciente a deambular para evitar a atelectasia pulmonar e o acúmulo de secreções respiratórias.
 - (E) Não administrar analgesia regular, pois o alívio progressivo da dor é típico da involução da doença.
- 43) A criança submetida ao transplante renal deve ser avaliada quanto à presença de rejeição do enxerto quando exibir os seguintes sinais e sintomas: febre, edema, dor à palpação sobre a área do enxerto, além de
- (A) diminuição do débito urinário e hipertensão.
 - (B) aumento do débito urinário e plaquetopenia.
 - (C) diminuição do débito urinário e hipotensão.
 - (D) aumento do débito urinário e hipertensão.
 - (E) diminuição do débito urinário e plaquetopenia.

- 44) As alterações no perfil de morbimortalidade da população mundial projetam a hipertensão arterial sistêmica (HAS) como um dos maiores desafios à saúde pública. Segundo Brunner e Suddarth (2011), em relação à hipertensão, é correto afirmar que
- (A) a hipertensão primária é a elevação da pressão arterial relacionada à etiologia identificada.
 - (B) o tratamento da hipertensão inclui modificações no estilo de vida, tais como: redução do peso corporal; prática regular de atividade física e aumento do consumo de sódio na dieta.
 - (C) a hipertensão, uma vez diagnosticada, deve ser monitorada a intervalos regulares, visto que é uma condição permanente.
 - (D) recomenda-se posicionar o braço do paciente acima do nível do coração para a aferição da pressão arterial.
 - (E) o uso de um manguito menor que o apropriado para o tamanho do paciente irá fornecer uma medição de pressão arterial mais baixa.
- 45) A punção lombar é um exame comum para obter material para o diagnóstico de disfunções neurológicas. Segundo Brunner e Suddarth (2011), qual das afirmativas a seguir está correta, em relação à assistência de Enfermagem durante a punção lombar?
- (A) Antes do procedimento, o paciente é posicionado em decúbito lateral, com as pernas estendidas ao máximo, para aumentar o espaço intervertebral.
 - (B) Durante a introdução da agulha no espaço subaracnóideo, o paciente é orientado a se manter em apneia, prevenindo traumatismo da medula espinhal.
 - (C) Após o procedimento, o paciente deve ser instruído a ficar deitado em decúbito ventral, evitando o extravasamento de líquido cefalorraquidiano.
 - (D) Após o procedimento, o paciente deve ser orientado a manter restrição hídrica para reduzir o risco de cefaleia.
 - (E) Após a retirada da agulha, deve ser aplicado um grande curativo compressivo no local da punção.

- 46) No exercício da profissão, os profissionais de Enfermagem têm acesso a informações confidenciais, devendo manter sigilo profissional sobre as mesmas. Com relação às responsabilidades e aos deveres dos profissionais de Enfermagem sobre fato sigiloso, é correto afirmar que
- (A) o profissional de Enfermagem fica desobrigado de manter sigilo profissional em caso de falecimento da pessoa envolvida.
 - (B) o fato sigiloso não poderá ser revelado mesmo quando for considerado necessário à prestação da assistência.
 - (C) o segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação for solicitada por pais ou responsáveis.
 - (D) o profissional de Enfermagem fica desobrigado de manter sigilo profissional quando intimado como testemunha de inquérito judicial.
 - (E) o profissional de Enfermagem fica desobrigado de manter segredo profissional quando o fato sigiloso se tornar de conhecimento público.
- 47) Segundo Brunner e Suddarth (2011), o enfermeiro deve orientar o paciente a tomar que cuidado específico, após a infusão do quimioterápico oxaliplatina, a fim de minimizar os efeitos colaterais desse fármaco?
- (A) Incentivar a deambulação.
 - (B) Usar lubrificante labial.
 - (C) Evitar a ingestão de líquidos frios.
 - (D) Evitar a exposição ao sol.
 - (E) Utilizar emolientes fecais.

48) Com relação aos procedimentos e eventos ocorridos nas fases de pré, trans e pós-operatório, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale, a seguir, a opção que apresenta a sequência correta.

- () A constipação é um efeito adverso comum no uso de opioides, principalmente no pós-operatório.
- () A infusão de agentes anestésicos no espaço intraespinal tem como efeito adverso a cefaleia espinal.
- () A infusão de opioides no espaço subaracnóideo não deve ser utilizada nos pacientes em pós-operatório.
- () As posições laterais são utilizadas em cirurgias renais.

- (A) (V) (V) (V) (F)
- (B) (F) (F) (V) (F)
- (C) (V) (F) (V) (V)
- (D) (F) (V) (F) (V)
- (E) (V) (V) (F) (V)

49) Segundo Kurcgant (2006), na Enfermagem, pode ser observada, em diferentes graus, a influência das teorias da administração. Dessa forma, é correto afirmar que a influência da Teoria Clássica reflete na profissão, através da

- (A) valorização das relações interpessoais.
- (B) visão holística do paciente.
- (C) desvalorização da estrutura organizacional.
- (D) divisão do trabalho.
- (E) descentralização das decisões.

50) Segundo Brunner e Suddarth (2011), a diabetes melito abrange um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis aumentados de glicose no sangue. Em relação a essa patologia, é correto afirmar que

- (A) no diabetes do tipo 1, os indivíduos apresentam deficiência relativa na produção de insulina e resistência aumentada a esse hormônio.
- (B) recomenda-se moderação com relação ao consumo de álcool pelo portador de diabetes, devido ao risco de hiperglicemia.
- (C) a hemoglobina glicosilada é um teste da glicose urinária que reflete os níveis médios dessa molécula.
- (D) no diabetes do tipo 2, os indivíduos produzem pouca ou nenhuma insulina, devido à destruição das células beta no pâncreas.
- (E) quando a insulina é administrada em áreas cicatrizadas (lipodistrofia), a absorção desse medicamento pode ser retardada.