

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31) Em relação à etiologia das fissuras labiopalatais, não se conseguiu isolar um fator causal específico, mas, sim, enumerar alguns possíveis fatores genéticos e ambientais. Assinale a alternativa que apresenta três possíveis agentes teratogênicos discutidos na literatura.

- a) Síndrome de *Apert*, otite e deficiência nutricional.
- b) Síndrome de *Crouzon*, radiação ionizante e fumo.
- c) Deficiência nutricional, radiação ionizante e toxoplasmose.
- d) Alcoolismo, drogas anticonvulsivas e Síndrome de *Apert*.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- a Síndrome de *Apert* é um fator genético, e não um agente teratogênico, e a otite não é citada na literatura como agente teratogênico;
- a Síndrome de *Crouzon* é um fator genético e não um agente teratogênico; e,
- a Síndrome de *Apert* é um fator genético, e não um agente teratogênico

Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. **Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e Saúde Oral**. São Paulo: Pancast, 2000.

32) Em pacientes com fissuras labiopalatinas é notória uma maior ocorrência de anomalias dentárias, nos dentes adjacentes à fenda alveolar. Assinale a alternativa que apresenta três alterações dentárias comuns nesses pacientes.

- a) Hipoplasia de esmalte, dentes supranumerários e agenesias.
- b) Agenesia, dentinogênese imperfeita e incisivo lateral conoide.
- c) Incisivo lateral conoide, hipoplasia de esmalte e amelogênese imperfeita.
- d) Amelogênese imperfeita, dentes supranumerários e hipoplasia de esmalte.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

A alternativa correta é a “A”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- a dentinogênese imperfeita é um defeito de esmalte hereditário e não apresenta maior ocorrência nos pacientes com fissuras labiopalatinas;
- a amelogênese imperfeita é um defeito de esmalte hereditário e não apresenta maior ocorrência nos pacientes com fissuras labiopalatinas; e,
- a amelogênese imperfeita é um defeito de esmalte hereditário e não apresenta maior ocorrência nos pacientes com fissuras labiopalatinas.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais**. São Paulo: Santos, 2007.

33) Os pacientes com necessidades especiais apresentam os mesmos problemas bucais e dentais que os outros indivíduos e suas necessidades devem ser satisfeitas praticamente da mesma maneira. Acerca do tratamento odontológico de pacientes com necessidades especiais, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Podem ser atendidos nas unidade básicas de saúde, mas devem ser submetidos somente a tratamentos não invasivos, devido às suas características de saúde.
- () Devem receber atendimento multidisciplinar, com profissionais que possuam conhecimento técnico e científico e formação humanística.
- () Devem ser atendidos somente em unidades básicas de saúde que possuam equipamentos para sedação com óxido nitroso.
- () Na maioria dos casos, o atendimento odontológico é realizado sob anestesia local, sem necessidade de sedação.

- a) V – V – F – V
- b) V – V – V – F
- c) V – F – F – F
- d) F – V – F – V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

A primeira e a terceira afirmativas são **falsas**, respectivamente, pois:

- os pacientes especiais devem ser submetidos aos mesmos tratamentos que os demais pacientes, e não somente aos tratamentos não invasivos.
- os pacientes especiais podem ser atendidos em qualquer unidade básica de saúde, e não somente naquelas que possuam equipamentos para sedação com óxido nitroso.

Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. **Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e Saúde Oral**. São Paulo: Pancast, 2000.

34) A paralisia cerebral é um distúrbio caracterizado por um conjunto de perturbações motoras e sensoriais, persistentes, mas não progressivas do sistema nervoso central. Em relação à paralisia cerebral, marque a afirmativa correta.

- a) É considerada uma doença congênita.
- b) As causas genéticas representam mais de 50% dos casos.
- c) Pode ser causada por fatores perinatais como prematuridade e anoxias cerebrais.**
- d) Todos os pacientes apresentam deficiência mental, sendo a maioria no grau moderado.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- a paralisia cerebral pode ser causada por problemas pós-natais, como meningite, traumatismo craniano ocorridos durante o desenvolvimento do Sistema Nervoso Central;
- as causas genéticas representam menos de 5% dos casos; e,
- a paralisia cerebral é um defeito físico, podendo afetar ou não a capacidade intelectual.

Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. **Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e Saúde Oral**. São Paulo: Pancast, 2000.

35) Os pacientes com necessidades especiais podem ser classificados em grupos, segundo os comprometimentos e/ou as áreas comprometidas pela patologia, presentes naquele indivíduo. Associe as duas colunas relacionando os desvios apresentados com seus respectivos grupos. A seguir, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (1) Paralisia Cerebral | () Defeitos congênitos. |
| (2) Síndrome de <i>Down</i> | () Desvios comportamentais. |
| (3) Psicose | () Desvios psíquicos. |
| (4) Autismo | () Defeitos físicos. |

- a) 1 – 4 – 3 – 2
- b) 2 – 4 – 3 – 1**
- c) 4 – 2 – 1 – 3
- d) 2 – 3 – 4 – 1

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A alternativa correta é a “B”. Ressalta-se que:

- a Paralisia Cerebral é uma perturbação das funções somático-motoras, causada por uma lesão encefálica que pode ocorrer antes, durante e também após o nascimento, portanto não pode ser inserida no grupo de defeitos congênitos;
- a Síndrome de Down é considerada um defeito congênito;
- a Psicose é um desvio psíquico, e não está associada a defeitos físicos; e,
- o Autismo é considerado um desvio comportamental.

Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. **Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e Saúde Oral**. São Paulo: Pancast, 2000.

36) Os analgésicos não opioides são indicados para dor de pequena e média intensidade. Em relação a esses analgésicos, marque a alternativa correta.

- a) Mesmo em doses terapêuticas, o paracetamol pode causar náuseas e prolongar o tempo de protrombina.
- b) O analgésico de escolha para as gestantes é a dipirona, pois é o único analgésico que não ultrapassa a barreira placentária.
- c) O paracetamol é contraindicado para diabéticos, pois altas doses podem baixar a glicemia e doses reduzidas podem ter efeito contrário.
- d) **Pacientes com problemas hepáticos devem fazer uso de ácido acetilsalicílico (AAS) com a devida cautela, pois quando empregado de forma crônica, pode causar problemas hemorrágicos.**

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- o AAS pode causar náuseas e prolongar o tempo de protrombina;
- o analgésico de escolha para as gestantes é o paracetamol; e,
- o AAS é contraindicado para diabéticos, pois altas doses podem baixar a glicemia e doses reduzidas podem ter efeito contrário.

Fonte: YAGIELA, John A. *et al.* **Farmacologia e Terapêutica para Dentistas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

Leia a situação abaixo para responder às questões 37 e 38.

Paciente do sexo masculino, 55 anos, logo após ser anestesiado, apresentou tontura, mal-estar, sudorese, formigamento nas pontas dos dedos e visão turva. Ao tomar o pulso, o cirurgião dentista constatou aumento da frequência cardíaca.

37) O paciente apresenta, provavelmente, um quadro de

- a) **crise hipertensiva.**
- b) choque anafilático.
- c) síncope vasovagal.
- d) síncope extrapiramidal.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

A alternativa correta é a “A”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- os sintomas do choque anafilático são: chiado, tosse, dispneia, rubor, tumefação nos lábios e na língua; e,
- nas síncope ocorrem diminuição da pressão arterial e perda da consciência.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais**. São Paulo: Santos, 2007.

38) A conduta correta para o paciente em questão é

- a) administrar 0,3 ml de uma solução de adrenalina 1:100.000, monitorar sinais vitais e solicitar serviço médico de urgência.
- b) interromper o tratamento, colocar o paciente deitado e instituir as manobras de suporte básico de vida, incluindo ressuscitação cardiopulmonar.
- c) **avaliar a pressão arterial, manter o paciente numa posição confortável, de preferência sentado, e, se não houver melhora, solicitar socorro médico.**
- d) colocar o paciente em decúbito dorsal com os pés mais elevados, avaliar sinais vitais, administrar oxigênio e, se não houver melhora, solicitar socorro médico.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- a administração de adrenalina deve ser feita nos casos de choque anafilático.
- a ressuscitação cardiopulmonar deve ser instituída somente quando há parada cardiovascular; e,
- nos casos de crise hipertensiva, o paciente deve ser colocado numa posição confortável, de preferência sentado.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais**. São Paulo: Santos, 2007.

39) A respeito dos anestésicos locais utilizados em odontologia, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Os produtos de inflamação baixam o pH do tecido afetado e limitam a formação da base livre, podendo retardar ou impossibilitar o bloqueio nervoso eficaz.
- () Os anestésicos locais, embora utilizados para deprimir a condução nervosa periférica, podem interferir na transmissão do impulso nervoso em qualquer tecido excitável.
- () A administração de Cloridrato de Lidocaína 2% com Fenilefrina 1:50.000 é a mais adequada para emprego rotineiro na odontologia.
- () A Prilocaína possui um metabólito tóxico, a o-toluidina, que pode levar à metemoglobinemia pela oxidação da hemoglobina.

- a) F – F – V – F
- b) V – V – F – V**
- c) V – F – V – F
- d) F – V – F – V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A única afirmativa **falsa** é a terceira, pois a administração de Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 é a mais adequada para emprego rotineiro na odontologia.

Fonte: YAGIELA, John A. *et al.* **Farmacologia e Terapêutica para Dentistas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

40) Acerca da Síndrome de *Down*, que é considerada a anomalia cromossômica mais comum entre os neonatos, analise as afirmativas.

- I. A deficiência mental está presente em apenas 50% dos pacientes.
- II. A profilaxia antibiótica é indicada para todos os pacientes.
- III. As mulheres com idade avançada apresentam maior risco de gerar uma criança com a síndrome.
- IV. A língua fissurada é uma manifestação bucal frequente.

Estão corretas somente as afirmativas

- a) I e II.
- b) II e IV.
- c) III e IV.**
- d) I, II e III.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A primeira e a segunda afirmativas estão **incorretas**, respectivamente, pois:

- a deficiência mental está presente em todos os pacientes com Síndrome de Down, sendo a maioria de grau leve; e,
- a profilaxia antibiótica é indicada apenas para os pacientes que apresentam cardiopatias congênitas.

Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. **Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e Saúde Oral**. São Paulo: Pancast, 2000.

41) A endocardite infecciosa é uma infecção importante das válvulas cardíacas ou das superfícies endoteliais do coração, decorrente da invasão de agentes infecciosos. Assinale a alternativa que apresenta uma condição cardíaca na qual a profilaxia antibiótica da endocardite é recomendada para procedimentos odontológicos invasivos.

- a) Disfunção valvular adquirida.**
- b) Prolapso da válvula mitral sem regurgitação.
- c) Cirurgia de enxerto de ponte coronária prévia.
- d) Sopros cardíacos fisiológicos, funcionais ou inocentes.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

A alternativa correta é a “A”, visto que a profilaxia antibiótica da endocardite não é recomendada para as demais condições cardíacas apresentadas.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais**. São Paulo: Santos, 2007.

42) As infecções bacterianas, fúngicas e viróticas de origem bucal no paciente em estado crítico, internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devem ser diagnosticadas e tratadas precocemente, pois o envolvimento sistêmico frequentemente é fatal. Sobre o tratamento das infecções bucais nesses pacientes imunocomprometidos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A candidíase é uma das causas mais frequentes de infecção hospitalar.
- b) O tratamento da candidíase deve ser sistêmico, pois o tratamento tópico é pouco efetivo.**
- c) O tratamento de lesões herpéticas deve ser realizado com antiviral sistêmico, pois as terapias tópicas são pouco efetivas.
- d) As manifestações do herpes zoster podem ser bastante graves, pois o vírus pode se propagar, causando pneumonia e hepatite.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A alternativa **incorreta** é a "B", pois a candidíase deve ser tratada através de terapia tópica única ou associada ao tratamento sistêmico.

Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. **Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar.** São Paulo: Santos, 2012.

43) O diabetes é uma doença que tem sido relacionada a alguns problemas bucais como:

- I. candidíase oral;
- II. glossite migratória benigna;
- III. língua avermelhada e saburrosa;
- IV. queilite actínica.

Estão corretas somente as alternativas

- a) I e II.
- b) I, II e III.**
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A afirmativa IV está **incorreta**, pois queilite actínica é uma alteração pré-maligna do vermelhão do lábio inferior e não está associada ao diabetes.

Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. **Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar.** São Paulo: Santos, 2012.

44) Em relação aos cuidados odontológicos do paciente oncológico, é correto afirmar que

- a) a quimioterapia geralmente causa danos agudos na cavidade oral, que podem não ser solucionados com a descontinuidade da terapia.**
- b) a radioterapia sempre causa danos permanentes na cavidade oral, que podem ser em maior ou menor grau, dependendo da área irradiada.
- c) durante o tratamento quimioterápico, os pacientes devem ser submetidos ao tratamento odontológico para a remoção de focos infecciosos.
- d) após o diagnóstico do tipo de câncer, o cirurgião dentista deve realizar apenas os tratamentos de urgência antes de iniciar a quimioterapia.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

A alternativa correta é a "A". As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- a radioterapia na região de cabeça e pescoço causa danos permanentes na cavidade oral;
- durante o tratamento quimioterápico, o tratamento odontológico invasivo é contraindicado, sendo indicado antes do início da quimioterapia; e,
- após o diagnóstico do tipo de câncer, o cirurgião-dentista deve realizar todo o tratamento odontológico necessário, e não somente os tratamentos de urgência.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais.** São Paulo: Santos, 2007.

45) Segundo a *American Psychiatric Association*, a deficiência mental é uma função intelectual geral subnormal, que se origina durante o período de desenvolvimento e está associada à perda ou retardo de aprendizado e ajuste social ou maturação ou ambos. São citadas como possíveis causas pré-natal, perinatal e pós-natal da deficiência mental, respectivamente:

- a) Prematuridade, hiperbilirrubinemia e radiação.
- b) Síndrome de *Down*, hiperbilirrubinemia e asma.
- c) **Síndrome de *Down*, prematuridade e desnutrição.**
- d) Toxoplasmose na gravidez, hiperbilirrubinemia e varicela.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- prematuridade é uma causa perinatal;
- a asma não tem sido citada na literatura como possível causa da deficiência mental; e,
- a varicela não tem sido citada na literatura como possível causa da deficiência mental.

Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. **Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e Saúde Oral**. São Paulo: Pancast, 2000.

46) Na prática odontológica é comum o atendimento a indivíduos portadores de doenças infectocontagiosas. Acerca das doenças ocupacionais, marque a alternativa correta.

- a) A sífilis é uma doença de origem virótica que pode ser transmitida nas fases primária e secundária.
- b) **A hepatite C apresenta alto risco de contaminação na prática odontológica, especialmente, para os profissionais de especialidades cirúrgicas.**
- c) O herpes simples é uma doença pouco frequente e pode ser transmitida por contaminação direta, por lesões ou objetos contaminados pelo vírus.
- d) A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença de origem virótica que apresenta alto risco de contaminação na prática odontológica.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A alternativa correta é a “B”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- a sífilis é uma doença de origem bacteriana;
- o herpes simples é uma doença muito frequente; e,
- a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença de origem virótica que apresenta baixo de contaminação na prática odontológica..

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais**. São Paulo: Santos, 2007.

47) O processo de envelhecimento humano provoca alterações anatomofisiológicas nas estruturas bucais que podem influir no tratamento endodôntico. Em relação à terapia endodôntica em dentes permanentes de idosos, é correto afirmar que

- a) **a diminuição da câmara pulpar e o estreitamento do canal radicular dificultam o tratamento endodôntico.**
- b) o tratamento endodôntico, quando necessário, pode ser realizado, mas com várias alterações na sequência técnica.
- c) para a execução do tratamento endodôntico, menor tempo é requerido, devido às condições sistêmicas do paciente.
- d) devido às dificuldades encontradas, deve-se optar pela exodontia dos dentes com comprometimento endodôntico.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

A alternativa correta é a “A”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- o tratamento endodôntico, quando necessário, deve ser realizado.
- maior tempo é requerido, devido às condições sistêmicas apresentadas pelos pacientes idosos e à atresia dos canais radiculares; e,
- o tratamento endodôntico em idosos, do ponto de vista da sequência técnica, não difere daquele realizado em adultos jovens.

Fonte: VENDOLA, M. C. C.; NETO, A. R. **Bases Clínicas em Odontogeriatría**. São Paulo: Santos, 2009.

48) Várias adaptações fisiológicas ocorrem nas estruturas bucais decorrentes do envelhecimento. Diante disso, é correto afirmar que

- a) há um aumento da dimensão vertical decorrente da erupção ativa.
- b) pode ocorrer aumento do diâmetro dos canalículos dentinários, tornando os dentes mais sensíveis.
- c) há uma diminuição da espessura da lâmina dura, devido às forças mecânicas atípicas sobre o dente.
- d) ocorre perda da crista óssea alveolar e a gengiva se desloca no sentido da raiz, provocando uma recessão gengival.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- há uma diminuição da dimensão vertical devido aos desgastes progressivos com perdas de superfícies oclusais e incisais;
- ocorre uma diminuição do diâmetro dos canalículos dentinários, bem como há um aumento no limiar de sensibilidade dentária devido à mineralização dos canalículos dentinários; e,
- a lâmina dura se torna mais espessa e irregular devido às forças mecânicas atípicas sobre o dente.

Fonte: VENDOLA, M. C. C.; NETO, A. R. **Bases Clínicas em Odontogeriatrics**. São Paulo: Santos, 2009.

49) No idoso, as alterações mais relevantes na farmacocinética estão associadas à redução do metabolismo hepático e ao declínio da eliminação renal da droga. Considerando essas alterações, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () As manifestações da idade apresentam grande variabilidade individual e dependem das doenças associadas.
- () A diminuição de conteúdo de água corporal aumenta o risco de efeitos tóxicos.
- () Os anestésicos sem vasoconstritores são os mais indicados, pois minimizam o risco de toxicidade.
- () A dose recomendada de anestésico local é praticamente a mesma utilizada nos adultos jovens, exceto em casos de doenças cardíacas associadas.

- a) V – V – V – F
- b) V – V – F – F
- c) F – F – V – V
- d) V – V – F – V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A terceira e a quarta afirmativas são **falsas**, respectivamente, pois:

- a utilização de anestésico sem vasoconstritores aumenta o risco de superdosagem e toxicidade; e,
- a dose recomendada para idosos é significativamente menor do que a dose indicada para adultos jovens.

Fonte: VENDOLA, M. C. C.; NETO, A. R. **Bases Clínicas em Odontogeriatrics**. São Paulo: Santos, 2009.

50) São manifestações bucais comuns da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) de etiologia viral, bacteriana e fúngica, respectivamente:

- a) gona, sífilis e paracoccidiodomicose.
- b) leucoplasia pilosa, gona e candidíase.
- c) herpes simples, eritema gengival linear e candidíase.
- d) eritema gengival linear, leucoplasia pilosa e candidíase.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- a gona é uma infecção de origem bacteriana; e
- o eritema gengival linear é uma infecção fúngica.

Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. **Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar**. São Paulo: Santos, 2012.

51) Para minimizar o estresse fisiológico e psicológico, a utilização de medicamentos pode ser necessária. Dentre as drogas ansiolíticas, marque a alternativa que aponta as que têm sido escolhidas para o controle da ansiedade em odontologia, devido a sua eficácia e segurança clínica.

- a) Barbitúricos.
- b) Anti-histamínicos.
- c) Benzodiazepínicos.
- d) Sedativos hipnóticos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- os sedativos barbitúricos ou hipnóticos têm como principal indicação o tratamento da insônia e foram muito empregados para controle da dor e ansiedade antes do advento dos benzodiazepínicos; e.
- os anti-histamínicos possuem eficácia reduzida no controle da ansiedade, sendo mais utilizados para crianças ou pacientes levemente ansiosos.

Fonte: YAGIELA, John A. *et al.* **Farmacologia e Terapêutica para Dentistas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

52) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Os pacientes com câncer podem apresentar algumas complicações bucais decorrentes da quimioterapia. A _____ caracteriza-se pela inflamação aguda da mucosa bucal, área ulcerada, que se torna edemaciada, eritematosa e friável, resultando em dor e disfagia.

- a) mucosite
- b) herpes zoster
- c) candidíase bucal
- d) úlcera bucal medicamentosa

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

A alternativa correta é a A. As demais estão incorretas, visto que a herpes zoster e a candidíase bucal não apresentam as características descritas e a úlcera bucal medicamentosa não é citada na literatura como uma complicação bucal da quimioterapia.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais**. São Paulo: Santos, 2007.

53) Na prática odontológica, o conhecimento sobre alguns aspectos psicológicos relacionados ao paciente com autismo, favorece seu atendimento. Em relação aos pacientes autistas, marque a alternativa **incorreta**.

- a) Apresentam uma necessidade imperiosa de manter imutável seu ambiente material.
- b) Possuem um distúrbio comportamental, caracterizado por uma complexa desordem de linguagem e socialização.
- c) Alguns indivíduos apresentam fala e inteligência intactas, outros apresentam sérios problemas no desenvolvimento da linguagem.
- d) Apresentam dificuldade de socialização, mas gostam do contato físico com as pessoas, por isso o profissional deve se esforçar para estabelecer um diálogo com o paciente.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

A alternativa **incorreta** é a “D”, pois os indivíduos com autismo não gostam do contato físico com as pessoas.

Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. **Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e Saúde Oral**. São Paulo: Pancast, 2000.

54) Em relação às hepatites virais, que são as mais frequentes, assinale a alternativa correta.

- a) O vírus da hepatite A atinge o fígado de forma crônica.
- b) O surgimento da vacina contra o vírus da hepatite C possibilitou maior controle da doença.
- c) A hepatite C é adquirida por via fecal-oral através da ingestão de água ou alimentos contaminados.
- d) Podem acarretar alterações na coagulação sanguínea, pois o fígado produz muitos dos fatores de coagulação.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- o vírus da hepatite A atinge o fígado de forma aguda;
- não há vacina disponível contra a hepatite C; e,
- a hepatite C é adquirida por via sanguínea e com menos frequência, pela via sexual.

Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. **Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar.** São Paulo: Santos, 2012.

55) A geriatria trata do envelhecimento patológico e a gerontologia trata do envelhecimento fisiológico. Em relação às patologias relacionadas às idades mais avançadas, assinale a alternativa correta.

- a) O mal de *Alzheimer* geralmente tem início entre 40 e 50 anos.
- b) O mal de *Parkinson* é uma doença relacionada ao envelhecimento fisiológico.
- c) **A catarata, o glaucoma e a aterosclerose são patologias relacionadas a idades mais avançadas.**
- d) O mal de *Alzheimer* caracteriza-se por tremores rítmicos das extremidades, caminhar lento e arrastado.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- o mal de *Alzheimer*, raramente, tem início na faixa etária abaixo dos 50 anos e afeta 50% dos indivíduos acima dos 85 anos;
- o mal de *Parkinson* é uma doença relacionada ao envelhecimento patológico, e não fisiológico; e,
- o mal de *Parkinson* caracteriza-se por tremores rítmicos das extremidades, caminhar lento e arrastado.

Fonte: MUGAYAR, Lêda R. F. **Pacientes Portadores de Necessidades Especiais: Manual de Odontologia e Saúde Oral.** São Paulo: Pancast, 2000.

56) Para o controle de infecção durante o atendimento odontológico, são necessárias algumas medidas de biossegurança. O conjunto de meios adotados para impedir a contaminação de micro-organismos numa determinada área pode ser definido como

- a) **assepsia.**
- b) antissepsia.
- c) degermação.
- d) descontaminação.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

A alternativa correta é a “A”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- antissepsia é a inativação ou a eliminação de micro-organismos de um tecido vivo (pele e mucosa);
- degermação é a remoção ou redução das bactérias em um tecido vivo, seja por limpeza mecânica (escova) ou por agentes químicos (sabão, detergentes); e,
- descontaminação é a remoção dos resíduos contaminados de qualquer superfície, reduzindo, assim, os micro-organismos presentes.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais.** São Paulo: Santos, 2007.

57) A asma é um estado clínico de hiper-reatividade da traqueia e dos brônquios a vários estímulos, resultando na constrição difusa das vias aéreas. Acerca da diminuição dos riscos de uma crise aguda asmática durante o atendimento odontológico de pacientes asmáticos, marque a alternativa correta.

- a) A profilaxia antibiótica deve ser realizada antes de procedimentos invasivos.
- b) Deve-se realizar a sedação oral com barbitúricos nos casos de pacientes ansiosos.
- c) **Não se deve iniciar procedimento eletivo, caso seja observado sibilos, tosse ou dispneia.**
- d) O paciente deve respirar ar enriquecido com CO₂, antes do atendimento odontológico, para corrigir a alcalose respiratória.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- a profilaxia antibiótica não diminui os riscos de uma crise aguda asmática e não é indicada para pacientes asmáticos, exceto nos casos de pacientes de alto risco que fazem uso de corticoterapia sistêmica;
- a sedação oral com barbitúricos deve ser evitada, pois está associada ao aumento da frequência de broncoespasmo e, quando devidamente indicada, deve ser feita a sedação inalatória com óxido nítrico; e,
- o paciente não deve respirar ar enriquecido com CO₂ antes do atendimento odontológico.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais.** São Paulo: Santos, 2007.

58) Em alguns pacientes com problemas sistêmicos, o cirurgião dentista pode utilizar o anestésico local mepivacaína sem vasoconstritor em procedimentos odontológicos simples e de curta duração. O uso de anestésicos locais, associados a vasoconstritores é contraindicado, no seguinte caso:

- a) gestante no primeiro trimestre gestacional.
- b) paciente diabético compensado dependente de insulina.
- c) **paciente com menos de seis meses após acidente vascular encefálico.**
- d) paciente hipertenso, se a pressão estiver situada abaixo de 140/90 mmHg.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A alternativa correta é a “C”. As demais estão incorretas, respectivamente, pois:

- pode-se utilizar o anestésico com vasoconstritor, preferencialmente lidocaína com adrenalina 1:100.000 nas gestantes, especialmente nos casos de urgências;
- os pacientes diabéticos compensados dependentes de insulina não apresentam contraindicações para o uso de vasoconstritores; e,
- se a pressão estiver situada abaixo do limite de 160/100 mmHg, o uso de adrenalina 1:100.000 não está contraindicado, podendo-se utilizar no máximo dois tubetes anestésicos.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais**. São Paulo: Santos, 2007.

59) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Os exames _____, tempo de _____, tempo de _____ e _____ correspondem aos exames de laboratório que o cirurgião-dentista deve recorrer para triar o paciente para eventuais distúrbios de hemostasia, pois são suficientes para diagnosticar a maioria das doenças hemorrágicas.

- a) Tempo de sangramento / protrombina / retração do coágulo / hematócrito
- b) Contagem de plaquetas / protrombina / tromboplastina parcial ativada / hematócrito
- c) Contagem de plaquetas / sangramento / protrombina / tempo de retração do coágulo
- d) **Contagem de plaquetas / sangramento / protrombina / tempo de tromboplastina parcial ativada**

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

A alternativa correta é a “D”. As demais estão incorretas, pois o exame tempo de retração do coágulo avalia de forma pouco sensível a função plaquetária e o hematócrito avalia o volume de hemácias em relação ao volume de sangue.

Fonte: SANTOS, Paulo S. S.; SOARES JUNIOR, Luiz A. V. **Medicina Bucal: a prática na Odontologia Hospitalar**. São Paulo: Santos, 2012.

60) Acerca da hiperplasia gengival nos pacientes com epilepsia, analise as afirmativas.

- I. Há uma correlação entre o grau de aumento gengival e a presença de fatores irritantes locais, como bandas ortodônticas.
- II. A hiperplasia gengival é consequência da ação do medicamento, agravada pela má higiene bucal.
- III. A dose diária do medicamento pode estar relacionada ao crescimento anormal.
- IV. O crescimento gengival é induzido pelo medicamento antiepilético, normalmente a fenitoína.

Estão corretas somente as afirmativas

- a) I e II.
- b) **I e IV.**
- c) II e III.
- d) II, III e IV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

As afirmativas I e IV estão **corretas**, visto que:

- há uma correlação entre o grau de aumento gengival e a presença de fatores irritantes locais, como bandas ortodônticas; e,
- o crescimento gengival é induzido pelo medicamento antiepilético, normalmente a fenitoína.

Fonte: HADDAD, Aida S. **Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais**. São Paulo: Santos, 2007.