


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA  
DIRETORIA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO  
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO  
(EsPC de SP/1940)**

**CONCURSO DE ADMISSÃO - 2000**



**PROVA DE MATEMÁTICA**

**24 Out 00  
das 14 h 00 min às 17 h 30 min  
(hora de Brasília-DF)**

# MATEMÁTICA

## INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

### 1. Confira a prova

- Sua prova contém 17 (dezesete) páginas impressas, numeradas de dois a dezessete.
- Nesta prova existem 30 (trinta) questões de Matemática impressas nas páginas de 05 a 17.

### 2. Condições de Execução da Prova

- O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, sendo os 15 (quinze) minutos iniciais destinados à retirada de dúvidas e os 15 (quinze) minutos finais para preencher o cartão de respostas.
- Em caso de alguma irregularidade na impressão ou montagem da sua prova, chame o Fiscal. Somente nos primeiros 15 (quinze) minutos será possível sanar as dúvidas.
- Nenhum candidato poderá deixar o local da prova antes de decorridos 02 (duas) horas e 20 (vinte) minutos.

### 3. Cartão de Respostas

- Para o preenchimento do cartão de respostas, siga a orientação do Oficial Aplicador.
- Escolha a única resposta certa dentre as alternativas apresentadas em cada questão, assinalando-a no cartão de respostas, com caneta preta.
- Ao terminar, entregue ao Oficial Aplicador ou a um dos Fiscais o cartão de respostas.
- O caderno de questões permanecerá no local da prova, sendo-lhe restituído nas condições estabelecidas pela Comissão de Aplicação.

**Boa Prova!**

## INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

- ◆ Consideram-se **alvéolos circulares** os pequenos círculos vazios do cartão. O candidato os preencherá com tinta de caneta preta para que o sensor da leitora ótica os detecte como opções de resposta.
- ◆ Use apenas **caneta preta** para preencher os campos do cartão.
- ◆ É obrigatório preencher os cinco alvéolos circulares correspondentes aos cinco dígitos do seu **Número de Inscrição**, inclusive os que tenham 0 ( zero ) à esquerda.  
Exemplo: 0 5 1 0 7 e não \_ 5 1 0 7 ou 5 1 0 7 \_.
- ◆ Preste bastante atenção no quadro abaixo para evitar que a sua opção, **mesmo certa, seja invalidada** pela leitora ótica:

COMO VOCÊ MARCOU A SUA OPÇÃO NO ALVÉOLO CIRCULAR	A LEITORA ÓTICA A INTERPRETOU COMO	OPÇÃO AVALIADA	OBSERVAÇÃO
	Uma Marcação	Validou	Só é válida a opção cuja <b>intensidade</b> da marcação seja suficiente para a leitura da sensibilidade e esteja <b>dentro</b> do limite do alvéolo circular.
	Nenhuma Marcação	Invalidou	Marcação insuficiente
	Nenhuma Marcação	Invalidou	Marcação insuficiente
	Dupla Marcação	Invalidou	Marcação fora do limite do alvéolo circular
			
			
			

- \* Leia as instruções constantes do corpo do cartão de respostas.
- \* Será considerado reprovado no Exame Intelectual e eliminado do Concurso, o candidato que preencher incorretamente, no cartão de resposta, os alvéolos que correspondem ao seu número de inscrição, no campo para tal destinado, conforme instruções.

## ALGUMAS NOTAÇÕES CONVENCIONAIS

$\mathcal{R}$	- conjunto dos números reais
$\mathcal{R}^*$	- conjunto dos números reais não nulos
$\mathcal{R}_+$	- conjunto dos números reais não negativos
$\mathcal{R}_+^*$	- conjunto dos números reais positivos
$\mathcal{R}_-$	- conjunto dos números reais não positivos
$\mathcal{R}_-^*$	- conjunto dos números reais negativos
$\mathcal{Q}$	- conjunto dos números racionais
$\mathcal{Q}^*$	- conjunto dos números racionais não nulos
$\mathcal{Z}$	- conjunto dos números inteiros
$\mathcal{Z}_+$	- conjunto dos números inteiros não negativos
$\mathcal{Z}^*$	- conjunto dos números inteiros não nulos
$\mathcal{N}$	- conjunto dos números naturais
$\mathcal{N}^*$	- conjunto dos números naturais não nulos
$\emptyset$	- conjunto vazio
$\cup$	- símbolo de união entre dois conjuntos
$\cap$	- símbolo de intersecção entre dois conjuntos
$\in$	- símbolo de pertinência entre elemento e conjunto
$\subset$	- símbolo de inclusão entre dois conjuntos
$f(x)$	- função na variável $x$
$f(a)$	- valor numérico da função no ponto $x = a$
$\log a$	- logaritmo decimal de $a$
$\log_b a$	- logaritmo de $a$ na base $b$
$\text{sen } \alpha$	- seno do ângulo $\alpha$
$\text{cos } \alpha$	- cosseno do ângulo $\alpha$
$\text{tg } \alpha$	- tangente do ângulo $\alpha$
$\text{cotg } \alpha$	- cotangente do ângulo $\alpha$
$\text{sec } \alpha$	- secante do ângulo $\alpha$
$\text{cossec } \alpha$	- cossecante do ângulo $\alpha$
$+\infty$	- mais infinito
$-\infty$	- menos infinito
$n!$	- fatorial de $n$

# MATEMÁTICA

## 1ª QUESTÃO

É correto afirmar que:

- A** A soma e a diferença de dois números naturais é sempre um número natural.
- B** O produto e o quociente de dois números inteiros é sempre um número inteiro.
- C** A soma de dois números racionais é sempre um número racional.
- D** A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional.
- E** O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional.

## 2ª QUESTÃO

Se  $A = [-5, 1[$  e  $B = ]-\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{5}[$ , então os conjuntos  $A-B$  e  $A \cap B$  são, respectivamente,

- A**  $[-5, -\frac{\sqrt{2}}{3}]$  e  $]-\frac{\sqrt{2}}{3}, 1[$
- B**  $[-5, -\frac{\sqrt{2}}{3}]$  e  $]-\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{5}[$
- C**  $]-\frac{\sqrt{2}}{3}, 1[$  e  $]-\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{5}[$
- D**  $[1, \sqrt{5}]$  e  $]-5, -\frac{\sqrt{2}}{3}[$
- E**  $]-\frac{\sqrt{2}}{3}, 1[$  e  $[-\frac{\sqrt{2}}{3}, 1]$

**3ª QUESTÃO**

O valor da soma entre o menor e o maior valor assumido pela expressão  $\frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} + \frac{2xy}{|xy|}$ , quando  $x$  e  $y$  variam no conjunto de todos os números reais não nulos, é

- A** -6
- B** -2
- C** 2
- D** 4
- E** 6

**4ª QUESTÃO**

Dada a equação  $|2x - 3| + |x| - 5 = 0$ , a soma de todas as suas soluções é igual a

- A** 3
- B** 8/3
- C** 2
- D** 4/3
- E** 2/3

**5ª QUESTÃO**


Se um retângulo tem base  $x$  e perímetro 100, então a área  $A$  do retângulo é dada em função de sua base por

- A**  $A(x) = x^2 - 50x$  ;  $0 < x < 50$
- B**  $A(x) = -x^2 + 50x$  ;  $0 < x < 50$
- C**  $A(x) = -x^2 + 100x$  ;  $0 < x < 100$
- D**  $A(x) = 2x(x - 50)$  ;  $0 < x < 50$
- E**  $A(x) = x(x - 100)$  ;  $0 < x < 100$

## 6ª QUESTÃO

Uma fábrica produz óleo sob encomenda, de modo que toda produção é comercializada. O custo da produção é composto de duas parcelas. Uma parcela fixa, independente do volume produzido, correspondente a gastos com aluguel, manutenção de equipamentos, salários, etc; a outra parcela é variável, depende da quantidade de óleo fabricado. No gráfico abaixo, fora de escala, a reta  $r_1$  representa o custo de produção, e a reta  $r_2$  descreve o faturamento da empresa, ambos em função do número de litros comercializados. O valor da parcela fixa do custo e o volume mínimo de óleo a ser produzido para que a empresa não tenha prejuízo são, respectivamente,

- A** R\$ 10000,00 , 10000 litros
- B** R\$ 15000,00 , 18000 litros
- C** R\$ 15000,00 , 15000 litros
- D** R\$ 20000,00 , 10000 litros
- E** R\$ 10000,00 , 15000 litros








## 7ª QUESTÃO

O domínio e a imagem da função  $f(x) = \frac{1}{5 - \sin x}$  são, respectivamente,

- A**  $\mathbb{R} - \{5\}$  e  $[-1, 1]$
- B**  $\mathbb{R}$  e  $\left] -\frac{1}{5}, \frac{1}{4} \right[$
- C**  $\mathbb{R}$  e  $\left[ \frac{1}{6}, \frac{1}{4} \right]$
- D**  $\mathbb{R}^*$  e  $\left[ \frac{1}{6}, \frac{1}{3} \right]$
- E**  $\mathbb{R} - \{5\}$  e  $\left[ -1, \frac{1}{3} \right]$

**8ª QUESTÃO**

Considere  $m, n$  e  $p$  números reais não nulos e as funções  $f$  e  $g$  de variável real, definidas por  $f(x) = mx^2 + nx + p$ , e  $g(x) = mx + p$ . A alternativa que melhor representa os gráficos de  $f$  e  $g$  é




### 9ª QUESTÃO

Pode-se afirmar que o sistema  $\begin{cases} 2x - 1 = 3 \operatorname{sen} \theta \\ x - 2 = \cos \theta \end{cases}$ ,  $x \in \mathbb{R}$  e  $0 \leq \theta < 2\pi$ ,

- A** possui apenas um par ordenado  $(x, \theta)$  como solução.
- B** possui dois pares ordenados  $(x, \theta)$  como solução.
- C** possui três pares ordenados  $(x, \theta)$  como solução.
- D** possui infinitas soluções.
- E** não possui solução.

### 10ª QUESTÃO

A figura abaixo fornece a representação gráfica da função  $y = \log_b x$



Nestas condições, o valor de  $b$  é

- A** 1/4
- B** 2
- C** 3
- D** 4
- E** 10

**11ª QUESTÃO**

A função  $f(x) = \log\left(\frac{1-x}{x+2}\right)$  tem por domínio

- A**  $] - 2, 1 [$
- B**  $\mathfrak{R} - \{-2\}$
- C**  $\mathfrak{R} - \{-2, 1\}$
- D**  $] - \infty, -2 [ \cup ] 1, +\infty [$
- E**  $\mathfrak{R}$

**12ª QUESTÃO**

Considere a soma  $S = \log\left(\frac{3}{2}\right) + \log\left(\frac{4}{3}\right) + \log\left(\frac{5}{4}\right) + \dots + \log\left(\frac{n}{n-1}\right)$ , em que  $n$  é um número natural. O menor valor de  $n$  para o qual  $S > 1$  é

- A** 20
- B** 21
- C** 22
- D** 25
- E** 29

**13ª QUESTÃO**

Há números reais para os quais o quadrado de seu logaritmo decimal é igual ao logaritmo decimal de seu quadrado. A soma dos números que satisfazem essa igualdade é

- A** 90
- B** 99
- C** 100
- D** 101
- E** 201

**14ª QUESTÃO**

Acrescentando 48 unidades a um número, seu logaritmo na base 5 aumenta de 2 unidades. Esse número é

- A** 1
- B** 2
- C** 3
- D** 6
- E** 12

**15ª QUESTÃO**

O valor da soma das raízes da equação  $2^{2x-2} - 17 \cdot 2^{x-3} + 1 = 0$  é

- A** -2
- B** -1
- C** 0
- D** 1
- E** 2

**16ª QUESTÃO**

José e Maria, acompanhados de seu filho Pedro, queriam se pesar. Para tanto, utilizaram uma balança defeituosa que só indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Desta forma, eles se pesaram, dois a dois, e obtiveram os seguintes resultados:

José e Pedro: 87 kg

José e Maria: 123 kg

Maria e Pedro: 66 kg

Diante desses resultados, pode-se concluir que

- A** cada um deles pesa menos que 60 kg.
- B** dois deles pesam mais que 60 kg
- C** José é mais pesado que Maria e Pedro juntos.
- D** Maria é a mais pesada dos três.
- E** o peso de Maria é a média aritmética dos pesos de José e Pedro.

**17ª QUESTÃO**

O conjunto solução da inequação  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ k & 1 & 3 \\ 1 & k & 3 \end{vmatrix} \leq 0$  é

- A**  $\{k \in \mathbb{R} / -4 \leq k \leq 1\}$
- B**  $\{k \in \mathbb{R} / -1 \leq k \leq 4\}$
- C**  $\{k \in \mathbb{R} / k \leq -1 \text{ ou } k \geq 4\}$
- D**  $\{k \in \mathbb{R} / k \leq -4 \text{ ou } k \geq 1\}$
- E**  $\emptyset$

**18ª QUESTÃO**

Sendo  $a, b$  e  $c$ , nesta ordem, termos de uma progressão aritmética em que  $a \cdot c = 24$  e  $A, B$  e  $C$ , nesta ordem, termos de uma progressão geométrica em que  $A = a$ ,  $B = c$  e  $C = 72$ , então o valor de  $b$  é

- A** 4
- B** 5
- C** 6
- D** 7
- E** 8

**19ª QUESTÃO**

Pode-se afirmar que a função real  $y = \frac{(2x^2 - x - 1) \cdot (x + 3)}{x^2 + 2x - 3}$ , após convenientemente simplificada, é equivalente a

- A**  $y = 2x + 1$  para  $\mathcal{R} - \{-3, 1\}$
- B**  $y = x^2 + 1$  para  $\mathcal{R} - \{-3, 1\}$
- C**  $y = x - 2$  para  $\mathcal{R} - \{-3, 1\}$
- D**  $y = x + \frac{1}{2}$  para  $\mathcal{R} - \{-3, 1\}$
- E**  $y = 3x + 1$  para  $\mathcal{R} - \{-3, 1\}$

**20ª QUESTÃO**

Num determinado jogo, é realizado um sorteio de 05 números num universo de 25 números. Pode-se participar do jogo comprando bilhetes contendo de 06 a 10 números e ganhará o prêmio aquele que acertar os 05 números sorteados. A probabilidade de um jogador ganhar o prêmio participando do sorteio com apenas um bilhete de 10 números é

- A**  $\frac{5!}{25!}$
- B**  $\frac{10!}{25!}$
- C**  $\frac{1}{625}$
- D**  $\frac{5}{625}$
- E**  $\frac{6}{1265}$

**21ª QUESTÃO**

O número de arcos existentes entre  $0^\circ$  e  $1560^\circ$  cujo seno vale  $\frac{2}{7}$  é

- A** 6
- B** 7
- C** 8
- D** 9
- E** 10

**22ª QUESTÃO**

O menor valor que a função real  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x^2+6x-9}$  pode assumir, é

- A** 1
- B** 2
- C**  $\frac{1}{2}$
- D**  $\frac{1}{4}$
- E**  $\frac{1}{8}$

**23ª QUESTÃO**

O valor de  $3\text{sen } 10^\circ \cdot (\text{tg } 5^\circ + \text{cotg } 5^\circ)$  é igual a

- A**  $\frac{3}{2}$
- B** 2
- C** 3
- D** 5
- E** 6

**24ª QUESTÃO**

O número de soluções da equação  $\sin^4 x + \cos^4 x = 1$ , satisfazendo a condição  $0 \leq x < 2\pi$ , é

- A** infinito
- B** 4
- C** 2
- D** 1
- E** 0

**25ª QUESTÃO**

Se  $y$  é a medida de um ângulo  $0^\circ < y < 30^\circ$ , o maior dentre os números  $\sin y$ ,  $\cos y$ ,  $\sin^2 y$ ,  $\cos^2 y$  e  $\sin y \cdot \cos y$  é

- A**  $\sin y$
- B**  $\cos y$
- C**  $\sin^2 y$
- D**  $\cos^2 y$
- E**  $\sin y \cdot \cos y$

**26ª QUESTÃO**

Sendo  $\left\{ k \in \mathbb{Z} \text{ e } x \neq \frac{k\pi}{4} \right\}$ , então  $2 - \frac{2 \operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} 2x}$  é equivalente a

- A**  $\cos^2 x$
- B**  $\sin^2 x$
- C**  $\sec^2 x$
- D**  $\operatorname{cosec}^2 x$
- E** 1

**27ª QUESTÃO**

Sendo  $\operatorname{sen} \alpha = 3 \cos \alpha$  e  $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ , o valor de  $\operatorname{cosec} \alpha$  é

**A**  $-\frac{\sqrt{10}}{3}$

**B**  $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

**C**  $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

**D**  $\sqrt{10}$

**E**  $\frac{\sqrt{10}}{3}$

**28ª QUESTÃO**

Entre duas cidades A e B há dois postos de pedágio, sendo o primeiro com 5 cabines e o segundo com 4 cabines. Há também 10 pontos de abastecimento. Um viajante realizará o percurso entre essas duas cidades passando pelos dois pedágios e parando três vezes para abastecimento. Entendendo por “formas diferentes de realizar o percurso” cada uma das opções de passar pelas cabines de pedágio e parar nos postos de abastecimento, o número de formas diferentes como ele poderá realizar o percurso da cidade A para a cidade B é

**A** 60

**B** 600

**C** 1200


**D** 2400

**E** 14400

**29ª QUESTÃO**

Num recipiente em forma de cilindro circular reto, com raio da base  $2\text{ cm}$  e altura  $6\sqrt{3}\text{ cm}$  (dimensões internas), há um volume de água de  $16\sqrt{3}\pi\text{ cm}^3$ . O maior ângulo  $\alpha$  que o plano da base do cilindro pode fazer com a horizontal para que a água não derrame ao se inclinar o cilindro é de, aproximadamente,

- |          |            |                              |                              |
|----------|------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>A</b> | $30^\circ$ | Dados (aproximados)          |                              |
|          |            | $\text{tg } 30^\circ = 0,58$ | $\text{tg } 60^\circ = 1,73$ |
| <b>B</b> | $40^\circ$ | $\text{tg } 40^\circ = 0,84$ | $\text{tg } 70^\circ = 2,75$ |
| <b>C</b> | $50^\circ$ | $\text{tg } 50^\circ = 1,19$ |                              |
| <b>D</b> | $60^\circ$ |                              |                              |
| <b>E</b> | $70^\circ$ |                              |                              |


**30ª QUESTÃO**

Uma fábrica produz monitores para computador que têm a forma de um bloco retangular associado a um tronco de pirâmide, conforme o desenho e dimensões abaixo. Os monitores são acondicionados para venda em caixas cúbicas, com aresta  $40\text{ cm}$ , medidos internamente. Os espaços vazios da caixa são preenchidos com isopor, para proteger o aparelho. Sabendo que a produção diária da fábrica é de  $300$  aparelhos, podemos dizer que o consumo diário de isopor em metros cúbicos é de

Dados: volume da pirâmide  $\rightarrow V = \frac{1}{3}S_b \cdot h$

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | 2 |
| <b>B</b> | 3 |
| <b>C</b> | 4 |
| <b>D</b> | 5 |
| <b>E</b> | 6 |

$S_b \rightarrow$  área da base  
 $h \rightarrow$  altura



**GABARITO DA PROVA**

<b>CONCURSO 2000 MATEMÁTICA</b>			
<b>ITEM</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>ITEM</b>	<b>ALTERNATIVA</b>
1	C	16	C
2	A	17	D
3	C	18	D
4	C	19	A
5	B	20	E
6	A	21	D
7	C	22	A
8	E	23	E
9	B	24	B
10	D	25	B
11	A	26	C
12	B	27	A
13	D	28	D
14	B	29	D
15	E	30	E