

**PROCESSO SELETIVO**

**DE**

**ADMISSÃO**

**AO**


**COLÉGIO NAVAL**

**(PSACN/2004)**

**(1ª FASE)**

**MATEMÁTICA**

1)



Na figura acima, ABCD é um quadrado de área 104 e o ponto O é o centro do semicírculo de diâmetro AB. A área do triângulo AEF é dada por

- (A)  $2(3\sqrt{3} + 3)$
- (B)  $6(4\sqrt{3} - 3)$
- (C)  $5(4\sqrt{3} - 6)$
- (D)  $3(4\sqrt{3} - 3)$
- (E)  $8(4\sqrt{3} - 3)$

2) Um certo professor comentou com seus alunos que as dízimas periódicas podem ser representadas por frações em que o numerador e o denominador são números inteiros e, neste momento, o professor perguntou aos alunos o motivo pelo qual existe a parte periódica. Um dos alunos respondeu justificando corretamente, que em qualquer divisão de inteiros

- (A) o quociente é sempre um inteiro.
- (B) o resto é sempre um inteiro.
- (C) o dividendo é o quociente multiplicado pelo divisor, adicionado ao resto.
- (D) os possíveis valores para o resto têm uma quantidade limitada de valores.
- (E) que dá origem a uma dízima, os restos são menores que a metade do divisor.

Prova : Amarela  
Profissão : PROVA DE MATEMÁTICA

Concurso : PSACN


3) Um professor de Matemática apresentou uma equação do 2º grau completa, com duas raízes reais positivas, e mandou calcular, as médias aritmética, geométrica e harmônica entre essas raízes, sem determiná-las. Nessas condições

- (A) somente foi possível calcular a média aritmética.
- (B) somente foi possível calcular as médias aritmética e geométrica.
- (C) somente foi possível calcular as médias aritmética e harmônica.
- (D) foi possível calcular as três médias pedidas.
- (E) não foi possível calcular as três médias pedidas.

4) Sabendo-se que a equação  $x^2(x^2 + 13) - 6x(x^2 + 2) + 4 = 0$  pode ser escrita como um produto de binômios do primeiro grau, a soma de duas das suas raízes reais distintas é igual a

- (A) -3
- (B) -2
- (C) -1
- (D) 2
- (E) 3

5)



Um retângulo ABCD de lados  $AB = a$  e  $BC = b$  ( $a > b$ ), é dividido, por um segmento EF, num quadrado AEFD e num retângulo EBCF, semelhante ao retângulo ABCD conforme a figura acima. Nessas condições, a razão entre  $a$  e  $b$  é aproximadamente igual a


- (A) 1,62
- (B) 2,62
- (C) 3,62
- (D) 4,62
- (E) 5,62

6) A interseção do conjunto solução, nos reais, da inequação

$$\frac{(x^2 - 2x + 1)^2}{12x - 4} \leq 0 \text{ com o conjunto } \{x \in \mathbb{R} / x < 4\} \text{ é dada por}$$

- (A)  $\{x \in \mathbb{R} / x < \frac{1}{3}\}$
- (B)  $\{x \in \mathbb{R} / x < 0\}$
- (C)  $\{x \in \mathbb{R} / x < \frac{1}{3}\} \cup \{2\}$
- (D)  $\{x \in \mathbb{R} / x < \frac{1}{3}\} \cup \{1\}$
- (E)  $\{x \in \mathbb{R} / x < 2\}$

7)



Na figura acima AM e BP são cevianas do triângulo ABC de área S. Sendo AP=2PC e AQ=3QM, qual é o valor da área do triângulo determinado pelos pontos P, Q e M, em função de S?

- (A)  $\frac{S}{16}$
- (B)  $\frac{S}{18}$
- (C)  $\frac{S}{20}$
- (D)  $\frac{S}{21}$
- (E)  $\frac{S}{24}$

- 8) Considere o triângulo escaleno ABC e os pontos P e Q pertencentes ao plano de ABC e exteriores a esse triângulo. Se: as medidas dos ângulos PAC e QBC são iguais; as medidas dos ângulos PCA e QCB são iguais; M é o ponto médio de AC; N é o ponto médio de BC;  $S_1$  é a área do triângulo PAM;  $S_2$  é a área do triângulo QBN;  $S_3$  é a área do triângulo PMC; e  $S_4$  é a área do triângulo QNC, analise as afirmativas:
- I -  $S_1$  está para  $S_4$ , assim como  $S_3$  está para  $S_2$ .  
II -  $S_1$  está para  $S_2$ , assim como  $(PM)^2$  está para  $(QN)^2$ .  
III-  $S_1$  está para  $S_3$ , assim como  $S_2$  está para  $S_4$ .

Logo pode-se concluir, corretamente, que

- (A) apenas a afirmativa I é verdadeira.  
(B) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  
(C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  
(D) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.  
(E) as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

- 9) Uma máquina é capaz de fabricar, ligada durante um tempo inteiro de minutos T,  $3^T$  peças, sendo que 20 % delas são defeituosas. Para obter-se, no mínimo, 605 peças perfeitas essa máquina deverá funcionar quantos minutos?

- (A) 4  
(B) 5  
(C) 6  
(D) 7  
(E) 8

- 10) Um número natural N tem 2005 divisores positivos. Qual é o número de bases distintas da sua decomposição em fatores primos?

- (A) Um.  
(B) Dois.  
(C) Três.  
(D) Quatro.  
(E) Cinco.

Prova : Amarela  
Profissão : PROVA DE MATEMÁTICA

Concurso : PSACN

11) Um aluno resolvendo uma questão de múltipla escolha chegou ao seguinte resultado  $\sqrt[4]{49 + 20\sqrt{6}}$ , no entanto as opções estavam em números decimais e pediu-se a mais próxima do valor encontrado para resultado, e, assim sendo, procurou simplificar esse resultado, a fim de melhor estimar a resposta. Percebendo que o radicando da raiz de índice 4 é quarta potência de uma soma de dois radicais simples, concluiu, com maior facilidade, que a opção para a resposta foi

- (A) 3,00
- (B) 3,05
- (C) 3,15
- (D) 3,25
- (E) 3,35

12) Se a, b, c e d são números reais não nulos tais que  $ad^2 + bc^2 = 0$ , pode-se afirmar que

- (A)  $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$ ;  $b+d \neq 0$
- (B)  $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{c+d}$ ;  $c+d \neq 0$
- (C)  $\frac{a}{d} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c+d}$ ;  $c+d \neq 0$
- (D)  $\frac{c}{a} + \frac{b}{d} = \frac{b+c}{a+d}$ ;  $a+d \neq 0$
- (E)  $\frac{c}{b} + \frac{d}{a} = \frac{c+d}{a+b}$ ;  $a+b \neq 0$

13) Um número natural N deixa: resto 2 quando dividido por 3; resto 3 quando dividido por 7; e resto 19 quando dividido por 41. Qual é o resto da divisão do número  $k = (N+1) \cdot (N+4) \cdot (N+22)$  por 861?

- (A) 0
- (B) 13
- (C) 19
- (D) 33
- (E) 43

14) Uma herança  $P$  foi dividida por dois herdeiros, com idades, respectivamente, iguais a  $n$  e  $m$ , em partes diretamente proporcionais ao quadrado de suas idades. Qual foi a parte da herança recebida pelo herdeiro de idade  $n$ ?

(A)  $\frac{P^2 n}{m^2 + n^2}$


(B)  $\frac{P n^2}{m^2 + n^2}$

(C)  $\frac{P^2 n^2}{m^2 + n^2}$

(D)  $\frac{P n^2 m}{m^2 + n^2}$

(E)  $\frac{P^2 n^2 m}{m^2 + n^2}$

15)



Qual é o produto notável representado, geometricamente, na figura acima, na qual ABCD é um retângulo?

(A)  $a^3 + b^3$

(B)  $(a + b)^3$

(C)  $(a + b)^2$

(D)  $(a^2 + b^2)^2$

(E)  $(a + b)^4$

16) O valor numérico da expressão  $120k^4 + 10k^2 + 8$ , sendo  $\underline{k}$  pertencente ao conjunto dos números naturais, é o quadrado de um número natural para

- (A) somente um único valor de  $\underline{k}$ .
- (B) somente dois valores de  $\underline{k}$ .
- (C) somente valores de  $\underline{k}$  múltiplos de 13.
- (D) somente valores de  $\underline{k}$  múltiplos de 18.
- (E) nenhum valor de  $\underline{k}$ .

17) Considere os pontos A, B e C pertencentes ao gráfico do trinômio do segundo grau definido por  $y=x^2-8x$ . Se: a abscissa do ponto A é -4; B é o vértice; a abscissa do ponto C é 12; o segmento AB tem medida  $d_1$ ; e o segmento BC tem medida  $d_2$ , pode-se afirmar que

- (A)  $d_1 + d_2 < 48$
- (B)  $48 < d_1 + d_2 < 64$
- (C)  $64 < d_1 + d_2 < 72$
- (D)  $72 < d_1 + d_2 < 128$
- (E)  $d_1 + d_2 > 128$

18) Dado um triângulo retângulo, seja  $\underline{P}$  o ponto do plano do triângulo equidistante dos vértices. As distâncias de P aos catetos do triângulo são  $\underline{K}$  e  $\underline{L}$ . O raio do círculo circunscrito ao triângulo é dado por

- (A)  $\frac{K + L}{4}$
- (B)  $2K + L$
- (C)  $\frac{\sqrt{K^2 + L^2}}{4}$
- (D)  $\frac{\sqrt{K^2 + L^2}}{2}$
- (E)  $\sqrt{K^2 + L^2}$

19) Dada a equação na variável real  $x : 7x - \frac{3}{x} = k$ , pode-se concluir , em função do parâmetro real  $k$ , que essa equação

- (A) tem raízes reais só se  $k$  for um número positivo.
- (B) tem raízes reais só se  $k$  for um número negativo.
- (C) tem raízes reais para qualquer valor de  $k$ .
- (D) tem raízes reais somente para dois valores de  $k$ .
- (E) nunca terá raízes reais.



- 20) Sejam  $L_1$  e  $L_2$  duas circunferências fixas de raios diferentes, que se cortam em  $A$  e  $B$ .  $P$  é um ponto variável exterior às circunferências (no mesmo plano). De  $P$  traçam-se retas tangentes à  $L_1$  e  $L_2$ , cujos pontos de contatos são  $R$  e  $S$ . Se  $PR=PS$ , pode-se afirmar que  $P$ ,  $A$  e  $B$
- (A) estão sempre alinhados.
  - (B) estão alinhados somente em duas posições.
  - (C) estão alinhados somente em três posições.
  - (D) estão alinhados somente em quatro posições.
  - (E) nunca estarão alinhados.

Prova : Amarela  
Profissão : PROVA DE MATEMÁTICA

Concurso : PSACN

PORTUGUÊS		MATEMÁTICA	
PROVA AMARELA		PROVA AMARELA	
01	B	01	D
02	C	02	D
03	A	03	D
04	D	04	E
05	B	05	A
06	E	06	D
07	A	07	B
08	E	08	E
09	D	09	D
10	B	10	A/B
11	D	11	C
12	C	12	B
13	D	13	A
14	C	14	B
15	D	15	C
16	E	16	E
17	A	17	E
18	D	18	E
19	E	19	C
20	C	20	A