

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2018)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL
EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

São fatores que interferem na cicatrização normal de feridas, EXCETO:

- (A) inflamação local.
- (B) edema.
- (C) sexo.
- (D) nutrição.
- (E) condições de vascularização.

QUESTÃO 2

De acordo com a Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, o Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente:

- (A) prescrição da assistência de enfermagem.
- (B) realizar consulta de enfermagem.
- (C) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- (D) realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- (E) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

QUESTÃO 3

A contenção envolve o uso de dispositivos mecânicos ou manuais para limitar a mobilidade física do paciente. Com relação às intervenções de enfermagem, relacionadas ao uso das contenções, marque a opção correta.

- (A) É necessário avaliar, em intervalos regulares, a necessidade do paciente permanecer com a contenção.
- (B) A contenção deve ficar ao alcance do paciente.
- (C) Durante o processo de contenção, não é necessário explicar o procedimento ao paciente.
- (D) Está proibida a administração de medicamentos para a ansiedade ou agitação durante a contenção.
- (E) As contenções devem ser retiradas de uma só vez.

QUESTÃO 4

Durante o desempenho das atividades de enfermagem, o comportamento caracterizado pela ausência de precaução, indiferença e passividade é chamado de:

- (A) imprudência.
- (B) negligência.
- (C) imperícia.
- (D) dolo.
- (E) omissão de socorro.

QUESTÃO 5

As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas pela equipe de enfermagem treinada e capacitada para os procedimentos de manuseio, conservação, preparo e administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação. É função da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação, EXCETO:

- (A) prover, periodicamente, as necessidades de material e imunobiológicos.
- (B) promover a organização da sala de vacinação, não sendo necessário supervisionar a limpeza que fica sob responsabilidade da equipe de higienização.
- (C) manter as condições preconizadas de conservação de imunobiológicos.
- (D) atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito.
- (E) utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento.

QUESTÃO 6

Com relação ao uso de medicamentos no tratamento, prevenção e diagnóstico de doenças, é correto afirmar que:

- (A) anti-hipertensivos são exemplos de medicamentos que promovem a cura.
- (B) as vacinas podem atuar na prevenção de doenças.
- (C) antibióticos são medicamentos com ação paliativa.
- (D) contrastes são medicamentos que, associados aos exames radiográficos, possuem ação terapêutica.
- (E) pomadas e colírios são considerados medicamentos de ação sistêmica.

QUESTÃO 7

Sobre a coleta de urina de 24 horas, é correto afirmar que:

- (A) é uma técnica de coleta asséptica.
- (B) deve-se desprezar a primeira micção do dia.
- (C) deve-se desprezar somente o primeiro jato de urina.
- (D) deve-se anotar desde a primeira micção do dia.
- (E) deve-se realizar cateterismo para coleta.

QUESTÃO 8

O sarampo é considerado uma doença infecciosa aguda, transmissível e extremamente contagiosa. Com relação à transmissão do sarampo, é correto afirmar que:

- (A) o período de transmissibilidade é de 2 a 4 dias antes do aparecimento do exantema.
- (B) dá-se através da picada do mosquito *Aedes aegypti*.
- (C) o período de maior transmissibilidade ocorre 2 dias após o término do exantema.
- (D) o macaco é o principal reservatório e fonte de transmissão da doença.
- (E) ocorre de pessoa a pessoa, através de secreções nasofaríngeas.

QUESTÃO 9

A fototerapia consiste em um processo terapêutico baseado na ação de luz artificial sobre o organismo humano. O recém-nascido recebe esse tipo de tratamento quando apresenta:

- (A) sofrimento respiratório.
- (B) icterícia.
- (C) cianose.
- (D) infecção.
- (E) eritroblastose fetal.

QUESTÃO 10

Para garantir uma terapia intravenosa adequada, o técnico de enfermagem, após o início da terapia, deve monitorar o paciente, com frequência para:

- (A) observar sinais de flebite ou infecção.
- (B) independente das condições do cateter, manter a infusão.
- (C) independente do aspecto do curativo, evitar trocá-lo.
- (D) manter a terapia, mesmo que o paciente relate dor.
- (E) manter o gotejamento rápido, apesar de sinais de infiltração.

QUESTÃO 11

Qual o principal distúrbio metabólico ósseo, ligado à idade, caracterizado pela perda de matriz óssea e aumento do risco de fraturas?

- (A) Hipertireoidismo.
- (B) Luxação.
- (C) Hipotireoidismo.
- (D) Osteogênese.
- (E) Osteoporose.

QUESTÃO 12

Para serem administrados 1000 ml de solução fisiológica em 8 horas, o gotejamento em microgotas por minuto é:

- (A) 125
- (B) 87
- (C) 72
- (D) 63
- (E) 58

QUESTÃO 13

Para administrar 20 unidades internacionais (UI) de insulina regular em um paciente diabético, utilizando-se um frasco de 100 UI e seringa de 3 ml, deve-se aspirar:

- (A) 0,2 ml
- (B) 0,5 ml
- (C) 0,7 ml
- (D) 1 ml
- (E) 1,2 ml

QUESTÃO 14

Os sinais e sintomas que envolvem o trato urinário podem decorrer de distúrbios dos rins, ureteres ou bexigas. A anúria caracteriza-se por:

- (A) ausência de débito urinário ou débito inferior a 50 ml nas 24 horas.
- (B) passagem de gás na urina durante a micção.
- (C) pequeno volume de urina com débito entre 100 e 500 ml nas 24 horas.
- (D) grande volume de urina eliminado em determinado intervalo de tempo.
- (E) micção excessiva à noite, que interrompe o sono.

QUESTÃO 15

São sinais presuntivos de gravidez:

- (A) contrações intermitentes do útero.
- (B) batimentos cardíacos fetais.
- (C) mamas aumentadas e dolorosas.
- (D) alterações no formato, tamanho e consistência do útero.
- (E) HCG positivo.

QUESTÃO 16

A hidroterapia ou balneoterapia é o banho do paciente queimado em uma banheira de água ou com chuveiro, para facilitar a limpeza e debridamento da área queimada. É um cuidado de enfermagem durante esse procedimento:

- (A) monitorar os pulsos periféricos.
- (B) nunca deixar o paciente sem assistência na banheira.
- (C) manter o paciente em dieta zero, até a peristalse retornar (um a dois dias).
- (D) manter a hidroterapia o maior tempo possível.
- (E) não manter a técnica asséptica durante o banho.

QUESTÃO 17

Um ambiente limpo e organizado é de grande importância na reabilitação do paciente. A limpeza geral ou terminal da unidade tem como finalidade:

- (A) manter a unidade com aparência desordenada.
- (B) preparar um leito seguro e sem conforto.
- (C) remover sujidades e micro-organismos para prevenir infecções.
- (D) facilitar a propagação de infecção.
- (E) promover a infecção hospitalar.

QUESTÃO 18

A lavagem intestinal (enteroclise) deve ser realizada com o paciente em que posição?

- (A) Decúbito ventral.
- (B) Litotômica.
- (C) Sims.
- (D) Canivete.
- (E) Trendelenburg.

QUESTÃO 19

A hérnia é uma protusão de órgão, tecido ou estrutura através da parede da cavidade em que ela está normalmente contida. A hérnia ventral caracteriza-se por:

- (A) estar localizada dentro do canal inguinal.
- (B) estar localizada ao redor de um estoma e para dentro do tecido subcutâneo.
- (C) ser uma protusão intestinal decorrente da fraqueza da parede abdominal.
- (D) ser uma protusão intestinal no umbigo.
- (E) ser uma hérnia para dentro do canal femoral.

QUESTÃO 20

O Diabetes Mellito (DM) é uma das principais síndromes crônicas que acometem a população atual. Com relação às orientações importantes ao paciente em uso de insulinoterapia, é correto afirmar que:

- (A) deve-se agitar o frasco de insulina para homogeneizá-lo antes da administração.
- (B) o frasco de insulina deve ser armazenado no congelador da geladeira.
- (C) não há necessidade de limpeza da tampa do frasco com algodão e álcool antes do preparo.
- (D) deve-se higienizar as mãos antes e após manusear a insulina e os materiais para aplicação.
- (E) não é importante realizar o rodízio do local de aplicação da insulina.

QUESTÃO 21

As afecções dermatológicas são usualmente descritas pelos tipos das lesões que aparecem na pele, pelos seus formatos e configuração. É considerada uma lesão secundária?

- (A) Nódulo.
- (B) Cisto.
- (C) Pústula.
- (D) Bolha.
- (E) Úlcera.

QUESTÃO 22

Com relação à sondagem nasogástrica (SNG), é correto afirmar que:

- (A) é a introdução de uma sonda, através da boca ou do nariz, até o esôfago.
- (B) não pode ser utilizada para drenagem de suco gástrico.
- (C) não é necessário utilização de luvas para colocação da SNG.
- (D) durante introdução da SNG, deve-se colocar o paciente em decúbito elevado (Fowler ou sentado).
- (E) é proibido o uso de lubrificantes para realização do procedimento de colocação da SNG.

QUESTÃO 23

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das doenças crônicas mais prevalentes na população mundial. Assinale a opção que apresenta um fator de risco para HAS.

- (A) Diabetes Mellitus.
- (B) Insuficiência cardíaca congestiva.
- (C) Exercícios aeróbicos regulares.
- (D) Aumento da ingestão de sódio.
- (E) Emagrecimento excessivo.

QUESTÃO 24

Quais termos indicam o aumento da frequência cardíaca e a diminuição da pressão arterial, respectivamente?

- (A) Taquicardia e hipertensão.
- (B) Taquicardia e hipotensão.
- (C) Taquicardia e normotensão.
- (D) Bradicardia e hipotensão.
- (E) Bradicardia e hipertensão.

QUESTÃO 25

São sintomas clássicos do Diabetes Mellitus:

- (A) fadiga, fraqueza, letargia e prurido vulvar.
- (B) prurido cutâneo, balanopostite, infecções de repetição e polidipsia.
- (C) polifagia, hipotensão, fraqueza e prurido vulvar.
- (D) fraqueza, infecções de repetição, hipertensão e perda involuntária de peso.
- (E) poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.

QUESTÃO 26

O recém-nascido prematuro é aquele nascido antes do término de 37 semanas de gestação. É considerado com baixo peso o recém-nascido cujo peso de nascimento, em gramas, é inferior a:

- (A) 3500
- (B) 3000
- (C) 2500
- (D) 1500
- (E) 1000

QUESTÃO 27

São características relacionadas a uma reação transfusional hemolítica aguda:

- (A) prurido e dispneia.
- (B) anafilaxia e veias cervicais distendidas.
- (C) vômito e diarreia.
- (D) hemossiderose e hepatite B.
- (E) dor lombar e hipotensão.

QUESTÃO 28

Na administração de medicamentos por via subcutânea, uma agulha 13 x 4,5 deve ser inserida na pele, formando um ângulo de:

- (A) 10°
- (B) 30°
- (C) 45°
- (D) 60°
- (E) 90°

QUESTÃO 29

São sinais e sintomas de Pressão intracraniana (PIC) aumentada em bebês, EXCETO:

- (A) vômito.
- (B) hipotermia.
- (C) fontanela tensa e abaulada.
- (D) choro alto e renitente.
- (E) inquietação e irritabilidade.

QUESTÃO 30

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, sobre o procedimento de aspiração das vias respiratórias, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- () Consiste na remoção da secreção em vias respiratórias por meio de uma sonda de aspiração conectada ao aspirador.
- () É indicada para pacientes que estejam impossibilitados de eliminar secreções.
- () Aconselha-se realizar movimentos circulares na sonda de aspiração, a medida que aspirar e retirar a sonda fechada.
- () Ao aspirar o paciente traqueostomizado, a sequência correta para realizar esse procedimento é: nariz, boca e cânula de traqueostomia.

- (A) (V) (V) (V) (F)
- (B) (V) (V) (F) (V)
- (C) (V) (F) (V) (V)
- (D) (F) (V) (V) (V)
- (E) (V) (V) (F) (F)

QUESTÃO 31

A sala de recuperação pós-anestésica é um setor do centro cirúrgico em que são dispensados cuidados intensivos no pós-operatório e na pós-anestesia imediatos. O paciente será mantido sob observação contínua, com o registro das observações, na primeira hora de permanência na unidade, a cada:

- (A) 10 minutos.
- (B) 15 minutos.
- (C) 20 minutos.
- (D) 25 minutos.
- (E) 30 minutos.

QUESTÃO 32

É finalidade do cateterismo vesical simples ou de alívio:

- (A) aliviar distensão abdominal e flatulência.
- (B) prevenir ou combater infecção urinária.
- (C) controlar débito urinário nos casos rigorosos.
- (D) desobstruir a sonda vesical.
- (E) coletar urina para exame.

QUESTÃO 33

Entende-se como medida preventiva para úlcera por pressão, EXCETO:

- (A) mudança constante de decúbito (de 2 em 2 horas).
- (B) proteção das proeminências ósseas.
- (C) manter a cama limpa e seca.
- (D) enxugar o paciente sem esfregar.
- (E) lavar o local afetado com sabão e água morna.

QUESTÃO 34

Em relação aos acidentes com animais peçonhentos, é correto afirmar que:

- (A) acidentes com serpentes não peçonhentas levam ao quadro neuromuscular.
- (B) a soroterapia deve ser realizada o mais rápido possível, e o número de ampolas dependerá do tipo e da gravidade do acidente.
- (C) a via de administração da soroterapia é intradérmica.
- (D) o envenenamento causado pela inoculação de veneno através do ferrão localizado na cauda do escorpião é chamado erucismo.
- (E) os acidentes por animais peçonhentos, atendidos nas unidades de saúde, não necessitam de notificação compulsória.

QUESTÃO 35

A gastrostomia é um procedimento cirúrgico que mantém uma comunicação da luz gástrica com o plano cutâneo da parede abdominal através de uma sonda. Com relação aos cuidados pós-operatórios da gastrostomia é correto afirmar que:

- (A) deve-se anotar o aspecto e o volume das drenagens apenas, a cada 48 horas.
- (B) a dieta deve ser administrada rapidamente.
- (C) a sonda deverá ser mantida aberta após as refeições.
- (D) deve-se observar rigorosamente o volume e os intervalos das refeições.
- (E) deve-se posicionar o paciente em Trendelenburg durante e após as refeições.

QUESTÃO 36

Qual opção NÃO apresenta uma característica da depressão?

- (A) Desesperança.
- (B) Risco de suicídio.
- (C) Baixa autoestima.
- (D) Confiança exagerada.
- (E) Tristeza intensa.

QUESTÃO 37

A drenagem torácica consiste na colocação de um dreno tubular no espaço intrapleural para drenar gases, líquidos ou sólidos. Em relação aos cuidados de enfermagem ao paciente em uso de dreno de tórax, é correto afirmar que:

- (A) o curativo deve ser trocado somente a cada 72 horas.
- (B) o dreno deve ser ordenhado sempre que possível.
- (C) o frasco coletor deve ser mantido acima do nível do tórax.
- (D) deve-se evitar clampar o dreno durante o transporte ou deambulação do paciente.
- (E) não é relevante a observação e a anotação do aspecto da drenagem.

QUESTÃO 38

As infecções nas incisões cirúrgicas constituem a segunda infecção hospitalar mais frequente e pode ser limitada ao sítio cirúrgico ou afetar o paciente a nível sistêmico. São manifestações clínicas da infecção da incisão cirúrgica:

- (A) ausência de febre e calafrios generalizados pelo corpo.
- (B) presença de temperatura e pulso diminuídos.
- (C) presença de linfonodos dolorosos e aumentados na região axilar ou inguinal mais próximos à incisão.
- (D) ausência de edema e manutenção da coloração da pele.
- (E) presença de dor diminuída a partir do sítio incisional.

QUESTÃO 39

A febre amarela é uma doença febril aguda de curta duração e gravidade variável. Seu agente etiológico é o:

- (A) mosquito *Haemagogus janthinomys*.
- (B) mosquito *Aedes aegypti*.
- (C) arbovírus do gênero flavivírus.
- (D) primata não humano (macaco).
- (E) homem sadio.

QUESTÃO 40

O cuidado emergencial pode ser definido como o cuidado ministrado ao paciente e orientado para as lesões, enfermidades sérias ou com potencial risco de vida. Sempre que um paciente se apresenta com uma condição de risco de vida potencial, deve-se proceder rapidamente de que maneira?

- (A) Manter o paciente próximo da fonte de perigo potencial: corrente elétrica ativa, água, incêndio.
- (B) Não despir o paciente, evitando exposição desnecessária.
- (C) Determinar se o paciente está plenamente consciente e, se estiver, avaliar via aérea, respiração e circulação de maneira sistemática.
- (D) Não pedir ajuda para o atendimento.
- (E) Avaliar a reação pupilar e o nível de responsividade à voz ou tato, quando indicado.

QUESTÃO 41

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza visa diminuir o impacto da gripe em todo o país. Com relação à vacina Influenza, é correto afirmar que:

- (A) deve ser administrada por via intradérmica.
- (B) é indicada para proteção contra infecções por pneumococo.
- (C) é contraindicada para menores de 2 anos de idade.
- (D) é composta por diferentes cepas do vírus *Myxovirus influenzae*.
- (E) é indicada para toda a população indígena a partir de 2 anos de idade.

QUESTÃO 42

O paciente que apresenta dispneia e ortopneia extremas, tosse com escarro espumoso, respiração ruidosa e veias cervicais distendidas tem um quadro de:

- (A) angina.
- (B) edema agudo de pulmão.
- (C) pericardite aguda.
- (D) miocardite crônica.
- (E) asma.

QUESTÃO 43

A tuberculose pode acometer vários órgãos, em consequência da disseminação hematogênica. No adulto, o sintoma mais frequente da tuberculose pulmonar é:

- (A) comprometimento do estado geral.
- (B) febre baixa vespertina.
- (C) comprometimento ganglionar mediastínico.
- (D) tosse produtiva.
- (E) sudorese noturna.

QUESTÃO 44

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma condição de perda súbita das funções cerebrais, resultante de uma interrupção do suprimento sanguíneo para uma parte do encéfalo. É um cuidado de enfermagem na fase de reabilitação do paciente acometido por essa enfermidade:

- (A) verificar sinais vitais de 2 em 2 horas.
- (B) anotar a quantidade de líquidos ingeridos ou administrados, a cada 24 horas.
- (C) colocar o paciente em decúbito ventral por 1 a 2 horas, diariamente.
- (D) orientar o paciente a exercitar as extremidades não afetadas, várias vezes ao dia.
- (E) anotar o volume da urina excretada a cada 24 horas.

QUESTÃO 45

A alta significa a saída do paciente do hospital, que deve ser por escrito, na papeleta e assinada pelo médico. É um procedimento de responsabilidade da equipe de enfermagem quanto à alta hospitalar:

- (A) anotar no relatório e na folha de evolução as condições do paciente, no momento da alta.
- (B) realizar a cobrança do período em que o paciente esteve internado.
- (C) deixar os pertences do paciente no posto de enfermagem.
- (D) orientar o paciente a levar para casa a roupa de cama usada durante a internação.
- (E) orientar o paciente quanto às rotinas do hospital e uso da campanha.

QUESTÃO 46

São poucas as situações em que pode haver indicação médica para substituição do leite materno. Assinale a opção que apresenta uma contraindicação ao aleitamento materno.

- (A) Mães infectadas com o vírus da dengue.
- (B) Consumo de cigarros.
- (C) Consumo eventual e moderado de álcool.
- (D) Mães com hanseníase, após o início do tratamento.
- (E) Mães infectadas pelo HIV.

QUESTÃO 47

O controle dos cânceres de mama e de colo do útero é um desafio para os gestores e profissionais responsáveis pelas políticas de saúde voltadas para as mulheres. Dentre os principais fatores de risco associados ao câncer de mama, destacam-se:

- (A) infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) e início precoce da atividade sexual.
- (B) aumento da idade e histórico familiar.
- (C) tabagismo e imunossupressão.
- (D) uso prolongado de contraceptivos orais.
- (E) multiplicidade de parceiros sexuais.

QUESTÃO 48

A doença hipertensiva induzida pela gravidez (DHEG) acontece entre 5 e 10% das gestações. É correto afirmar que a DHEG é adicionalmente dividida em:

- (A) hipertensão coincidente, eclâmpsia e hipertensão crônica.
- (B) hipertensão sem edema, pré-eclâmpsia e eclâmpsia.
- (C) pré-eclâmpsia, hipertensão transitória e eclâmpsia.
- (D) hipertensão sem edema, eclâmpsia e hipertensão transitória.
- (E) pré-eclâmpsia, hipertensão coincidente e eclâmpsia toxêmica.

QUESTÃO 49

A criança menor de dois meses com quadro de desidratação pode apresentar os seguintes sinais e sintomas:

- (A) letargia e sucção débil.
- (B) olhos normais e sinal de prega cutânea presente.
- (C) inquietude e sucção normal.
- (D) olhos fundos e vigor físico preservado.
- (E) sucção normal e olhos fundos.

QUESTÃO 50

É atribuição do técnico de enfermagem na assistência à gestante no pré-natal de baixo risco:

- (A) realizar visitas domiciliares para a identificação das gestantes e desenvolver atividades de educação em saúde.
- (B) realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco.
- (C) solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal.
- (D) verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no Cartão da Gestante.
- (E) orientar quanto à vacinação antitetânica e contra hepatite B.

ENFERMAGEM			
AMARELA		VERDE	
01 - C	26 - C	01 - E	26 - E
02 - C	27 - E	02 - E	27 - B
03 - A	28 - E	03 ANULADA	28 - A
04 - B	29 - B	04 - B	29 - D
05 - B	30 - A	05 - B	30 - D
06 - B	31 - B	06 - C	31 - B
07 - B	32 - E	07 - C	32 - D
08 - E	33 - E	08 - D	33 - B
09 - B	34 - B	09 - C	34 - B
10 - A	35 - D	10 - A	35 - E
11 - E	36 - D	11 - C	36 - E
12 - A	37 - D	12 - C	37 - D
13 - A	38 - C	13 - B	38 - C
14 - A	39 - C	14 - D	39 - A
15 - C	40 - E	15 - C	40 - E
16 - B	41 - D	16 - A	41 - C
17 - C	42 - B	17 - A	42 - E
18 - C	43 - D	18 - E	43 - D
19 - C	44 - D	19 - B	44 - D
20 - D	45 - A	20 - C	45 - B
21 - E	46 - E	21 - E	46 - A
22 - D	47 - B	22 - D	47 - B
23 ANULADA	48 - B	23 - A	48 - A
24 - B	49 - A	24 - B	49 - B
25 - E	50 - D	25 - B	50 - E