

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

**(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO
DE SAÚDE DA MARINHA / PS-CSM/2009)**

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

- 1) Qual é a causa mais freqüente de hemorragia pós-parto?
- (A) Retenção de tecido placentário.
(B) Atonia uterina.
(C) Laceração do trato genital.
(D) Gravidez múltipla.
(E) Placenta prévia.
- 2) Analise as afirmativas abaixo em relação às lesões causadas pelas queimaduras.
- I - As lesões por queimadura são descritas de acordo com a profundidade da lesão e a extensão da área superficial corporal lesada.
II - Na queimadura de espessura parcial ocorre destruição das camadas profundas da derme.
III - Uma queimadura de espessura plena envolve a destruição total da epiderme e derme, e, por vezes, o tecido subcutâneo.
IV - A profundidade da queimadura determina se ocorrerá a reepitelização.
V - Na queimadura de espessura superficial profunda a ferida tem aparência branco-pálida ou chamuscada.
- Assinale a opção correta.
- (A) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II e V são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- 3) Segundo Brunner (2005), assinale a opção que apresenta uma complicaçāo da terapia enteral relacionada a aspectos mecānicos.
- (A) Pneumonia de aspiração.
(B) Desidratação.
(C) Constipação.
(D) Distensão abdominal.
(E) Diarréia.

- 4) Que tipo de monitorização é utilizada para avaliar a função ventricular direita e o retorno do sangue venoso para o lado direito do coração?
- (A) Pressão arterial média.
(B) Hemodinâmica.
(C) Pressão da artéria pulmonar.
(D) Pressão venosa central.
(E) Pressão arterial sistêmica.
- 5) Em relação à via de administração das vacinas, é correto afirmar que a vacina
- (A) BCG é rigorosamente subcutânea, de preferência aplicada no braço direito.
(B) contra hepatite B é intramuscular profunda, devendo ser aplicada preferencialmente na região glútea, em adultos.
(C) contra a poliomielite é intramuscular.
(D) tríplice viral é subcutânea.
(E) contra *Haemophilus influenzae* do tipo b é oral.
- 6) Como é denominada a representação gráfica dos órgãos de uma administração e a relação de autoridade existente entre eles?
- (A) Fluxograma.
(B) Cronograma.
(C) Organograma.
(D) Diagrama.
(E) Funcionograma.
- 7) São exemplos de doenças que requerem a adoção de medidas de precaução aérea:
- (A) rubéola, sarampo e tuberculose pulmonar ou laríngea.
(B) meningite, varicela e rubéola.
(C) varicela, sarampo, tuberculose pulmonar ou laríngea.
(D) caxumba, varicela e tuberculose pulmonar ou laríngea.
(E) pneumonia, rubéola e meningite.

- 8) Os distúrbios hidroeletrolíticos ocorrem na prática clínica e devem ser corrigidos para a saúde e segurança do paciente. São sinais e sintomas de hipernatremia:
- (A) aumento do pulso e diminuição da pressão arterial.
(B) irritabilidade e convulsões focais.
(C) câimbras musculares e fraqueza.
(D) cefaléia e papiledema.
(E) confusão e pele seca.
- 9) De acordo com o sistema de Escore de Apgar, um neonato que, no primeiro minuto de vida, apresente freqüência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto, respiração irregular, alguma flexão dos membros, ausência de resposta a irritabilidade reflexa e pele pálida receberá avaliação igual a
- (A) 6
(B) 5
(C) 4
(D) 3
(E) 2
- 10) Assinale a opção que apresenta um cuidado de enfermagem após a biópsia renal.
- (A) Verificar os sinais vitais a cada 5 a 15 minutos na primeira hora.
(B) Estimular a deambulação imediata para evitar a trombose venosa.
(C) Orientar o paciente a não ingerir líquidos nas primeiras 12 horas.
(D) Realizar a troca do curativo duas vezes ao dia, evitando comprimir o local.
(E) Manter o paciente em decúbito lateral, voltado para o lado do rim punctionado.
- 11) Segundo KAPLAN (2007), são distúrbios no processo do pensamento:
- (A) trocadilhos e pensamento vago.
(B) delírios e paranóia.
(C) fobias e preocupações.
(D) idéias de referência e influência.
(E) obsessões e compulsões.

12) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, em relação às doenças infecciosas, suas formas de transmissão e agentes etiológicos, e assinale a opção correta.

- () A leptospirose é causada por uma bactéria, a *Leptospira interrogans*, sendo transmitida por contato com a urina de uma grande variedade de roedores e outros mamíferos silvestres contaminados.
- () A malária é causada pelo *Plasmodium* que é transmitido apenas por contato direto pela picada da fêmea do mosquito *Aedes* infectado.
- () O sarampo é transmitido através do contato com gotículas de saliva e secreções catarrais do doente, cujo agente etiológico é um membro da família *Paramixoviridae*.
- () A meningite meningocócica é uma infecção causada pela *Neisseria meningitidis* transmitida pelo contato direto com as secreções nasofaríngeas dos indivíduos infectados e por meio de perdigotos.
- (A) (V) (V) (F) (F)
(B) (F) (V) (F) (F)
(C) (V) (F) (V) (V)
(D) (V) (F) (F) (V)
(E) (V) (V) (V) (F)

13) A esquizofrenia tipo paranóide caracteriza-se por:

- (A) presença de delírios de perseguição ou grandeza.
(B) discurso e comportamento desorganizado.
(C) extremo negativismo ou mutismo.
(D) pensamento ilógico e embotamento emocional.
(E) regressão acentuada a um comportamento primitivo.

- 14) Em relação ao acondicionamento de resíduos de serviços de Saúde, pode-se afirmar que:
- (A) os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente à ruptura e vazamento, sendo permitido o seu reaproveitamento.
 - (B) os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, com tampa provida de sistema de abertura com contato manual.
 - (C) os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes rígidos e estanques, sem tampa rosqueada.
 - (D) a capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo.
 - (E) os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto necessitam de tampa para vedação.
- 15) De acordo com a RDC ANVISA 306/2004, são classificados como resíduos classe B:
- (A) meios de cultura, filtros de ar e gases aspirados de áreas contaminadas e medicamentos vencidos.
 - (B) restos de alimentos, resíduos de podas de árvores e jardim e bolsa transfusional vazia.
 - (C) órgãos, peças anatômicas e tecido adiposo proveniente de lipoaspiração.
 - (D) kits de linhas arteriais endovenosas e dialisadores, sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos e produtos hormonais.
 - (E) saneantes, reveladores e fixadores de RX e efluentes de equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas.
- 16) Assinale a opção que apresenta um sinal de presunção da gravidez.
- (A) Ausculta dos batimentos cardíacos fetais.
 - (B) Amolecimento do colo uterino, chamado sinal de Goodell.
 - (C) Escurecimento da mucosa vulvar e vaginal, chamado sinal de Chadwick.
 - (D) Amolecimento do istmo uterino, chamado sinal de Hegar.
 - (E) Palpação do contorno fetal.

- 17) Nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde são exemplos de áreas críticas:
- (A) berçário de alto risco, lavanderia, unidade de internação.
 - (B) lactário, vestiários, unidade de quimioterapia.
 - (C) laboratório, lactário, ambulatórios.
 - (D) salas de cirurgia, banheiros, unidade de terapia intensiva.
 - (E) laboratório de anatomia patológica, banco de leite, salas de parto.
- 18) Assinale a opção que NÃO apresenta uma complicações da terapia com insulina.
- (A) Hiperglicemia matinal.
 - (B) Resistência à insulina.
 - (C) Lipodistrofia por insulina.
 - (D) Reações alérgicas sistêmicas.
 - (E) Neuropatia.
- 19) De acordo com a RDC ANVISA 306/04, "a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final", é definida pelo termo:
- (A) segregação.
 - (B) acondicionamento.
 - (C) tratamento.
 - (D) coleta.
 - (E) manejo.
- 20) A vacina contra a tuberculose é o BCG liofilizado, obtido por atenuação do *Mycobacterium bovis*, apresentada em ampolas de múltiplas doses. Após a reconstituição, a vacina deve ser usada até:
- (A) 8 horas.
 - (B) 6 horas.
 - (C) 3 meses.
 - (D) o término da validade.
 - (E) 4 horas.

- 21) Para aplicar em um paciente 1.000UI de heparina, dispondo de frascos com 25.000 UI em 5ml, quanto deve ser aspirado, em ml, para cumprir corretamente a prescrição?
- (A) 0,15
(B) 0,20
(C) 0,25
(D) 0,30
(E) 0,35
- 22) Sobre o crescimento e desenvolvimento normal do lactente, é correto afirmar que
- (A) a fontanela posterior se fecha aos seis meses.
(B) o ato de engatinhar ocorre em torno dos nove meses.
(C) o ganho de altura médio por mês, durante os seis primeiros meses, é de 1,0cm.
(D) os primeiros dentes são dos incisivos centrais superiores.
(E) aos oito meses o reflexo de Moro desaparece.
- 23) Como é denominada a disfunção respiratória que impõe ao doente a posição ereta?
- (A) Ortopnéia.
(B) Bradipnéia.
(C) Polipnéia.
(D) Apnéia.
(E) Taquipnéia.
- 24) Das penalidades previstas no Código de Ética, qual é de competência exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem?
- (A) Advertência verbal.
(B) Advertência escrita.
(C) Censura profissional.
(D) Suspensão do exercício.
(E) Cassação do direito do exercício.
- 25) A fim de evitar a isoimunização Rh, quando a mãe susceptível deve receber uma dose da gamaglobulina anti-D (RhoGam)?
- (A) Imediatamente antes do parto.
(B) Nas primeiras 72 horas após o parto.
(C) No início da gestação.
(D) Um mês após o parto.
(E) Durante o pré-natal da segunda gestação.

- 26) A segunda via de escolha para a realização da "exsangüinotransfusão" é denominada veia
- (A) umbilical.
(B) subclávia.
(C) femoral.
(D) jugular.
(E) braquial.
- 27) Conforme a definição do Ministério da Saúde, o conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas é:
- (A) a rotina.
(B) o regulamento.
(C) o manual.
(D) a norma.
(E) o regimento.
- 28) Coloque V (verdadeiro) ou F(falso) nas afirmativas abaixo, em relação à morte súbita, assinalando a seguir, a opção correta.
- () A embolia pulmonar é causa cardíaca da morte súbita.
() Epinefrina e atropina são indicados na parada cardíaca com assistolia.
() O choque imediato é o determinante da sobrevida na fibrilação ventricular.
() A obstrução da artéria coronária extensa é fator de risco para a parada cardíaca recorrente.
- (A) (F) (F) (V) (V)
(B) (F) (V) (V) (V)
(C) (V) (F) (F) (F)
(D) (V) (V) (V) (V)
(E) (V) (V) (F) (V)
- 29) Que tipo de paciente tem risco aumentado de complicações pós-operatórias de trombose venosa profunda?
- (A) Submetido a cirurgia de reconstrução de joelho.
(B) Com peso maior que 110% do peso corporal total.
(C) Em repouso prolongado no leito.
(D) Submetido a cirurgia com duração superior a 3 horas.
(E) Desidratado e desnutrido.

- 30) Considerando uma prescrição de duas etapas de soro glicosado de 500 ml, e uma etapa de soro fisiológico também de 500 ml, com um gotejamento de 25 gotas por minuto, em quantas horas ocorrerá a infusão completa, se for utilizado um equipo onde 20 gotas = 1ml?
- (A) 8
(B) 12
(C) 16
(D) 20
(E) 24
- 31) Os resíduos hospitalares são classificados em grupo, de acordo com sua composição, características biológicas, físicas, químicas, estado da matéria e origem. Segundo esta classificação, os resíduos do grupo E são os:
- (A) radioativos.
(B) potencialmente infectantes.
(C) perfurocortantes.
(D) comuns.
(E) químicos.
- 32) A técnica que consiste em ouvir os sons produzidos dentro do corpo, criados pelo movimento do ar ou líquido, denomina-se:
- (A) tapotagem.
(B) inspeção.
(C) palpação.
(D) percussão.
(E) ausculta.
- 33) Em bebês, sinais e sintomas como plethora, cianose, dificuldade respiratória, alterações do sistema nervoso central, como convulsões, oligúria, hiperbilirrubinemia e hipoglicemia, caracterizam a
- (A) eritroblastose.
(B) hipocalcemia.
(C) policitemia.
(D) fenilcetonúria.
(E) sífilis congênita.

34) Assinale a opção que apresenta uma medida preventiva para evitar os acidentes ocupacionais com material perfuro-cortante.

- (A) Utilizar a lâmina de bisturi desmontada.
- (B) Não reencapar as agulhas utilizadas.
- (C) Não usar o propé com sapatos.
- (D) Desprezar as agulhas desconectadas das seringas.
- (E) Preferir fios sem agulha para suturas.

35) Caracterizada por episódios transitórios de dor ou desconforto no peito, subesternal, relacionado a atividades que aumentam a demanda de oxigênio miocárdico.

O trecho acima refere-se

- (A) à angina instável.
- (B) à angina variante.
- (C) à angina estável.
- (D) ao infarto agudo do miocárdio.
- (E) à isquemia silenciosa.

36) Uma avaliação diagnóstica completa do câncer inclui identificar o estágio e o grau do tumor. Em relação ao estagiamento, é correto afirmar que leva em consideração a avaliação da

- (A) dimensão do tumor secundário, a diferenciação da metástase e o grau de comprometimento.
- (B) extensão do tumor primário, localização do tumor, existência ou não de cápsula tumoral.
- (C) localização do tumor, grau de diferenciação celular e a dimensão dos linfonodos.
- (D) extensão do tumor primário, envolvimento de linfonodos e extensão da metastase.
- (E) localização, extensão e grau de diferenciação do tumor.

- 37) Assinale a opção que apresenta um dever do enfermeiro no exercício de sua profissão.
- (A) Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
(B) Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão.
(C) Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnico-científicos e culturais em benefício da cliente-la, coletividade e do desenvolvimento da profissão.
(D) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem.
(E) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- 38) Assinale a opção que NÃO apresenta um dos fatores de risco para a incontinência urinária.
- (A) Cirurgia genitourinária.
(B) Parto vaginal.
(C) Diabetes mellitus.
(D) Obesidade mórbida.
(E) Uretrite.
- 39) As vacinas de bactérias ou de vírus vivos atenuados, de um modo geral, NÃO devem ser administradas em pessoas com
- (A) doenças benignas febris.
(B) diagnóstico clínico pregresso da doença.
(C) desnutrição.
(D) antecedente familiar de convulsão.
(E) imunodeficiência congênita ou adquirida.
- 40) Que procedimento é empregado para avaliar o refluxo vesicoureteral?
- (A) Angiografia renal.
(B) Uretrocistografia miccional.
(C) Pielografia retrógrada.
(D) Urografia excretora.
(E) Cintilografia renal.

- 41) Uma manifestação clínica do hipotireoidismo é
- (A) o nervosismo.
 - (B) a exoftalmia.
 - (C) o apetite aumentado.
 - (D) o ganho de peso.
 - (E) a palpitação.
- 42) A doença desmielinizante progressiva, imunomedida do Sistema Nervoso Central (SNC), caracteriza a:
- (A) esclerose múltipla.
 - (B) miastenia grave.
 - (C) síndrome de Guillan Barré.
 - (D) mononeuropatia.
 - (E) paralisia de Bell.
- 43) O quadro de sangramento transcervical em gestante, associado à dilatação cervical progressiva e, freqüentemente, à ruptura das membranas com perda de líquido amniótico, é classificado como:
- (A) amniorraxe prematura.
 - (B) ameaça de abortamento.
 - (C) abortamento retido.
 - (D) aborto inevitável.
 - (E) aborto incompleto.
- 44) A terapêutica com o sulfato de magnésio para controle da pré-eclâmpsia requer alguns cuidados. Assinale a opção que apresenta um desses cuidados.
- (A) Oferecimento de uma dieta hipercalórica por via oral.
 - (B) Administração da droga por via intramuscular profunda, preferencialmente no deltóide.
 - (C) Controle horário do débito urinário por meio de sonda vesical.
 - (D) Aplicação de gelo no local da aplicação.
 - (E) Realização de curva térmica rigorosa.

- 45) Durante a consulta de pré-natal, a gestante traz a sua caderneta de vacinação onde constam três doses da vacina DPT na infância. Diante disso, o enfermeiro deve orientá-la a dirigir-se ao posto de saúde para receber:
- (A) três doses da vacina DPT, com intervalo mínimo de um mês entre a primeira e a segunda doses, e de seis meses entre a segunda e a terceira.
 - (B) um reforço da vacina dT, vinte dias ou mais antes da data provável do parto.
 - (C) três doses da vacina dT com intervalo mínimo de um mês entre a primeira e a segunda doses, e de seis meses entre a segunda e a terceira.
 - (D) uma dose da vacina DPT, pelo menos vinte dias antes do parto, completando o esquema de três doses após o nascimento do bebê.
 - (E) uma dose da vacina dT, pelo menos vinte dias antes do parto, completando o esquema de três doses após o nascimento do bebê.
- 46) Considerando a técnica de coleta de sangue periférico em neonatos através da punção do calcanhar, assinale a opção INCORRETA.
- (A) A complicação mais grave é a osteocondrite necrotizante.
 - (B) A punção não deve ser mais profunda que 2,4mm.
 - (C) Antes da amostra ser coletada, o calcanhar pode ser aquecido com compressas úmidas mornas.
 - (D) A punção deve ser realizada na região central do calcâneo.
 - (E) Antes da coleta, a área deve ser limpa com álcool a 70%.
- 47) As úlceras de pressão são lesões decorrentes de hipóxia celular e podem ser ocasionadas por fatores internos. Assinale a opção que NÃO apresenta um desses fatores.
- (A) Condições nutricionais.
 - (B) Peso corporal.
 - (C) Uso de corticóides.
 - (D) Mobilidade reduzida ou ausente.
 - (E) Cisalhamento.

- 48) Pela regra de Naegele, qual a data provável do parto de uma gestante, cuja última menstruação tenha ocorrido em 02/11/2008?
- (A) 07/08/2009
(B) 09/08/2009
(C) 12/08/2009
(D) 08/09/2009
(E) 12/09/2009
- 49) Segundo Silva, citado por Kurcgant (2006), qual termo caracteriza "a escolha fundamentada da pessoa adequada para desenvolver determinada atividade, num determinado local e tempo, objetivando uma maior eficiência individual e grupal"?
- (A) Recrutamento.
(B) Seleção.
(C) Treinamento.
(D) Desenvolvimento.
(E) Capacitação.
- 50) Assinale a opção que indica, segundo Kurcgant (2006), o tipo de liderança que é exercida por um líder cujo objetivo é a autodeterminação do grupo, o desenvolvimento das habilidades e capacidades de seus membros e a qualidade do desempenho dos indivíduos.
- (A) Autocrática.
(B) Moderadora.
(C) Laissez-faire.
(D) Democrática.
(E) Centralizadora.