

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

**(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO
DE SAÚDE DA MARINHA / CP-CSM/2012)**

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

- 1) Segundo BRUNNER (2009), na quimioterapia, os agentes antineoplásicos são usados em uma tentativa de destruir as células tumorais, uma vez que interferem nas funções celulares, inclusive na replicação. Em relação aos cuidados no extravasamento de agentes vesicantes intravenosos, é correto afirmar que:
- (A) compressas mornas no local são aplicadas quando o extravasamento é suspeitado, a menos que o vesicante extravasado seja um alcaloide da vinca.
(B) o médico pode aspirar qualquer medicamento infiltrado nos tecidos e injetar solução neutralizante dentro da região para reduzir a lesão tissular.
(C) as substâncias vesicantes podem ser administradas por técnicos de enfermagem, desde que habilitados por treinamento prévio.
(D) a administração de agentes quimioterápicos vesicantes através de cateteres atriais direitos é evitada devido o alto risco de lesão endotelial.
(E) os agentes vesicantes, quando depositados no tecido subcutâneo, causam necrose tissular, sem, contudo, comprometer estruturas, como nervos e tendões.
- 2) Segundo KAPLAN (1998), os sinais e sintomas iniciais de toxicidade por lítio incluem:
- (A) tremor, disartria e coma.
(B) mioclonia, convulsão e disartria.
(C) tremor, mioclonia e ataxia.
(D) mioclonia, convulsão e coma.
(E) tremor, disartria e ataxia.
- 3) Segundo KURCGANT (2006), a avaliação sistemática e formal de uma atividade, feita por alguém que não está envolvido na sua execução e com o propósito de determinar se esta atividade está sendo desenvolvida de acordo com seus objetivos, é denominada:
- (A) tomada de decisão.
(B) administração de pessoal.
(C) processo investigativo.
(D) avaliação da assistência.
(E) auditoria.

- 4) Em relação ao leite materno (LM), é correto afirmar que:
- (A) o pH do LM é um pouco maior que o do plasma, ou seja, mais alcalino.
 - (B) o LM das mães de recém-nascidos pré-termo tem alto teor de gordura e baixo teor de proteínas.
 - (C) as funções renais e hepáticas das nutrizes influenciam as concentrações das drogas no LM.
 - (D) a variação da composição lipídica do LM não influi na quantidade de droga nele contida.
 - (E) a idade do lactente não influencia na absorção de drogas contidas no LM.
- 5) Segundo BRUNNER (2009) a pancreatite aguda é um distúrbio grave que, pode ser considerado uma emergência médica associada a um alto risco de complicações, envolvendo risco de vida. Em relação a este distúrbio é correto afirmar que:
- (A) a ingestão oral de sólidos é suspensa, podendo manter-se a ingestão de líquidos leves em alguns casos.
 - (B) evita-se o uso de morfina para o alívio da dor sempre que possível.
 - (C) essa pancreatite geralmente leva à pancreatite crônica.
 - (D) a icterícia é o principal sintoma que faz com que o paciente procure os cuidados médicos.
 - (E) a aspiração nasogástrica pode ser utilizada para aliviar as náuseas e os vômitos.
- 6) Na cardioversão elétrica, o desfibrilador é ajustado para sincronizar com o ECG em um monitor cardíaco, de modo que o impulso elétrico seja disparado durante a
- (A) despolarização ventricular.
 - (B) despolarização atrial.
 - (C) repolarização ventricular.
 - (D) repolarização atrial.
 - (E) repolarização da fibra de Purkinje.

- 7) Em relação à amamentação, assinale a opção que apresenta uma orientação para ser dada à gestante.
- (A) Esfregar o mamilo com buchas e/ou toalha felpuda, para engrossar a pele.
(B) Higienizar os mamilos com sabonete neutro antes e após as mamadas.
(C) Realizar a expressão do peito, caso haja presença de colostro para evitar seu acúmulo.
(D) Tomar banhos de sol nas mamas por volta de 15 minutos, até as 10 horas da manhã ou após as 16 horas.
(E) Usar cremes e/ou pomadas nos mamilos para evitar as rachaduras.
- 8) Segundo KAPLAN (1998), a mirtazapina é um medicamento eficaz utilizado para o tratamento da depressão. Assinale a opção que representa uma reação adversa:
- (A) nexotoxidade.
(B) Sonolência.
(C) Hepatotoxicidade.
(D) Mialgia.
(E) Boca seca.
- 9) Assinale a opção que apresenta um cuidado imediato ao recém-nascido com gastrosquise ou onfalocele.
- (A) Manter alimentação por sonda nasogástrica.
(B) Posicionar o recém-nascido em decúbito lateral direito.
(C) Acessar veia profunda.
(D) Cobrir o local com gaze esterilizada e umedecida com soro fisiológico morno.
(E) Investigar sinais de comprometimento da circulação periférica dos membros superiores.
- 10) Qual o distúrbio ácido-básico que pode ocorrer ao se administrar oxigênio para um paciente com hipercapnia crônica?
- (A) Acidose respiratória aguda.
(B) Alcalose metabólica aguda.
(C) Acidose metabólica aguda.
(D) Alcalose respiratória aguda.
(E) Disfunção ácido-básica mista aguda.

- 11) Segundo TAYLOR (1992), os transtornos alimentares conhecidos como anorexia e bulimia nervosa aparecem com maior frequência
- (A) na primeira infância.
(B) na infância.
(C) na adolescência.
(D) na idade adulta.
(E) no início da terceira idade.
- 12) Ao avaliar um paciente atendido na sala de trauma da unidade de emergência, o enfermeiro observou a ocorrência de feridas nos membros superiores, com aspecto de sangue preso sob a superfície da pele, e uma incisão da pele com bordas bem definidas, mais longa que profunda, na região frontal. Esses ferimentos classificados, respectivamente, como:
- (A) avulsões em membros superiores e laceração em região frontal.
(B) hematomas em membros superiores e corte em região frontal.
(C) lacerações em membros superioresregião frontal.
(D) equimoses em membros superiores e corte em região frontal.
(E) abrasões em membros superiores e avulsão em região frontal.
- 13) Segundo TAYLOR (1992), tumores cerebrais e hipotireoidismo são as causas de alguns tipos de
- (A) demência.
(B) esquizofrenia.
(C) transtorno do humor.
(D) depressão.
(E) dependência química.
- 14) Segundo a Resolução do CONAMA nº 358/2005, os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, pertencem ao grupo
- (A) C
(B) D
(C) A
(D) E
(E) B

- 15) A confirmação do posicionamento das sondas enterais é essencial para a segurança do paciente. Um cuidado de enfermagem seguro não se limita a realizar esta verificação apenas em um momento, mas também cada vez que líquidos e alimentos são administrados ou uma vez por turno nas alimentações contínuas. Segundo BRUNNER (2009), recomenda-se para verificação nestes momentos o uso combinado de três métodos, que são:
- (A) Auscultação do ar injetado, avaliação visual do aspirado e medição do pH do aspirado.
(B) Medição do comprimento da sonda, exame radiográfico e avaliação visual do aspirado.
(C) Medição do comprimento da sonda, avaliação visual do aspirado e medição do pH do aspirado.
(D) Medição do pH do aspirado, exame radiográfico e ausculta do ar injetado.
(E) Medição do comprimento da sonda, ausculta do ar injetado e medição do pH aspirado.
- 16) Segundo BRUNNER (2009), a ventilação não invasiva com pressão positiva elimina a necessidade de intubação endotraqueal ou traqueostomia, e diminui o risco de infecções nosocomiais, como a pneumonia. Apesar desta vantagem, essa ventilação é contraindicada quando o paciente apresenta
- (A) comprometimento cognitivo.
(B) insuficiência cardíaca crônica.
(C) edema agudo de pulmão.
(D) doença pulmonar obstrutiva crônica.
(E) distúrbio respiratório relacionado ao sono.
- 17) Segundo MEEKER (1997), a hipertermia maligna é uma complicação rara e que coloca a vida do paciente em risco, tendo como uma das causas o uso de alguns medicamentos. Assinale a opção que apresenta as medicações implicadas na hipertermia maligna:
- (A) broncodilatadores e corticosteróides.
(B) antiviróticos e imunoglobulinas.
(C) anticoagulantes e hipotensores.
(D) antiespasmódicos e anti-inflamatórios.
(E) anestésicos inalados e succinilcolina.

- 18) Segundo KAPLAN (1998), os métodos padrões de se avaliar as concentrações de lítio estão relacionados a presença de tais concentrações no soro e no plasma, as quais devem ser determinadas no período de
- (A) 1 a 3 meses
(B) 1 a 4 meses
(C) 2 a 4 meses
(D) 2 a 5 meses
(E) 2 a 6 meses
- 19) Segundo a Resolução do CONAMA nº 358/2005, os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal devem elaborar e implantar o plano de gerenciamento de:
- (A) resíduos químicos.
(B) descarte de resíduos de saúde.
(C) resíduos de serviços de saúde.
(D) resíduos biológicos.
(E) descarte de material biológico.
- 20) Segundo LUECKENOTTE (2002), algumas das causas possíveis da perda progressiva de massa óssea total é o uso crônico de alguns medicamentos. Assinale a opção que apresenta um desses medicamentos.
- (A) Antidiarreico.
(B) Anti-hipertensivo.
(C) Antidepressivo.
(D) Inibidor de recaptação de serotonina.
(E) Corticosteroides.

21) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, em relação às ações que o profissional de saúde deve ter no atendimento a uma mulher com Doença Sexualmente Transmissível (DST).

- () Vacinar contra hepatite B, se a idade for menor que 30 anos.
- () Orientar a pessoa para que ela conclua o tratamento, mesmo se os sintomas tiverem desaparecido.
- () Criticar severamente seu comportamento de risco.
- () Oferecer preservativos, orientando sobre as técnicas de uso.
- () Notificar o caso no formulário apropriado.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- (A) (F) (V) (F) (V) (F)
- (B) (V) (V) (V) (F) (V)
- (C) (V) (F) (F) (V) (V)
- (D) (F) (V) (V) (V) (V)
- (E) (V) (V) (F) (V) (V)

22) Segundo BRUNNER (2009), ao realizar a evolução de enfermagem de um paciente sob seus cuidados, o enfermeiro deverá registrar, como oligúria, o débito urinário menor que quantos ml/dia?

- (A) 50
- (B) 80
- (C) 100
- (D) 200
- (E) 400

23) No método de índices de Apgar, são avaliados, no recém-nascido cinco sinais vitais. Assinale a opção que apresenta os exatos minutos em que são feitas estas avaliações no recém-nascido, logo após o nascimento.

- (A) 01, 05 e 10
- (B) 00, 05 e 15
- (C) 00, 05 e 10
- (D) 01, 10 e 15
- (E) 00, 10 e 15

- 24) Segundo BRUNNER (2009), a tetania é o principal sintoma do hipoparatiroidismo. Que sinal é positivo quando uma percurso aguda sobre o nervo facial, exatamente diante da glândula parótida e anterior à orelha, provoca o espasmo ou contratura da boca, nariz e olho; indicando tetania latente?
- (A) Babinski
(B) Chvostek
(C) Tik dououreux
(D) Troussseau
(E) Sheehan
- 25) Em relação à Resolução do COFEN 311/2007, Capítulo II, que dispõe sobre o sigilo profissional, assinale a opção que apresenta um dever do enfermeiro.
- (A) Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
(B) Assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistência de enfermagem livre de danos.
(C) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto em casos previstos.
(D) Registrar, no prontuário do paciente, as informações indispensáveis ao processo de cuidar.
(E) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
- 26) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.
Segundo Behrman e Shiono (2002), a menor mortalidade neonatal é encontrada no recém-nascido que pesa entre _____ g, e cuja idade gestacional é maior que _____ semanas.
- (A) 3.000 e 4.000 / 38
(B) 3.000 e 4.000 / 36
(C) 2.800 e 3.800 / 38
(D) 2.400 e 3.500 / 38
(E) 2.400 e 3.500 / 36

- 27) O cateterismo cardíaco é largamente usado para avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica no controle de pacientes com doença cardíaca. Segundo WOODS (2005), qual é a complicaçāo mais comum durante este procedimento?
- (A) Hipertensão severa.
(B) Arritmia.
(C) Tamponamento cardíaco.
(D) Embolia vascular.
(E) Hemorragia.
- 28) Segundo a Resolução do COFEN nº 311/2007, Capítulo VI, que dispõe sobre a aplicação das penalidades, o enfermeiro, ao delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde, que não seja enfermeiro, está sujeito a:
- (A) advertência verbal, censura e suspensão.
(B) multa, censura e cassação.
(C) censura, cassação e suspensão.
(D) multa, censura e suspensão.
(E) advertência verbal, multa e suspensão.
- 29) A Síndrome de Stevens-Johnson é uma patologia cutânea grave, que é deflagrada por:
- (A) microlesões da pele, que podem evoluir em infecção cutânea grave, especialmente em crianças e pacientes imunodeprimidos.
(B) hipertermia severa, com temperaturas corporais acima de 39,8°C.
(C) reação a medicamentos, como, por exemplo, agentes anticonvulsivantes e anti-inflamatórios não esteroidais.
(D) formas extra-pulmonares de tuberculose, especialmente do tipo miliar.
(E) formas graves de doença biliar de caráter obstrutivo, devido à icterícia e ao acúmulo de bilirrubina nas camadas superficiais da derme.

- 30) Segundo KURCGANT (2006), o manual de enfermagem é o instrumento que reúne, de forma sistematizada, normas, rotinas, procedimentos e outras informações necessárias para a execução das ações de enfermagem. Assinale a opção que apresenta duas finalidades deste manual.
- (A) Informar e subsidiar.
(B) Esclarecer e uniformizar.
(C) Informar e uniformizar.
(D) Esclarecer e subsidiar.
(E) Esclarecer e orientar.
- 31) Segundo KURCGANT (2006), assinale a opção que apresenta, na sequência correta, as etapas do processo decisório.
- (A) Avaliação, percepção do problema, definição do problema, coleta de dados, análise dos dados, redefinição do problema, procura de soluções, decisão, e implementação.
(B) Percepção do problema, avaliação, definição do problema, coleta de dados, análise dos dados, redefinição do problema, procura de soluções, decisão, e implementação.
(C) Percepção do problema, definição do problema, coleta de dados, análise dos dados, redefinição do problema, procura de soluções, decisão, implementação, e avaliação.
(D) Definição do problema, coleta de dados, análise dos dados, redefinição do problema, procura de soluções, decisão, implementação, avaliação, e percepção do problema.
(E) Definição do problema, coleta de dados, análise dos dados, redefinição do problema, avaliação, procura de soluções, percepção do problema, decisão, e implementação.
- 32) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.
As frequências cardíaca e respiratória mudam de acordo com os períodos de reatividade e comportamento dos lactentes, mas, em geral, variam, respectivamente, entre _____ batimentos/min e de _____ incursões respiratórias.
- (A) 160 e 180/70 a 90
(B) 150 e 170/60 a 80
(C) 140 e 160/50 a 70
(D) 120 e 150/40 a 60
(E) 120 e 140/30 a 60

- 33) Segundo TAYLOR (1992), durante o processo do envelhecimento, algumas alterações estruturais comuns são observadas no cérebro. Assinale a opção que apresenta uma dessas alterações.
- (A) Atrofia das circunvoluçãoes.
(B) Diminuição dos ventrículos.
(C) Aumento do peso do cérebro.
(D) Diminuição da desmielinização dos axônios.
(E) Estreitamento dos sulcos.
- 34) Grandes progressos foram obtidos na prevenção da doença de Rh, graças à disponibilidade da imunoglobulina anti-D (Rho-Gam). A administração deste medicamento NÃO é indicada quando a
- (A) mãe é D(-), Du(-).
(B) criança é D(+) (ou aborto de tipo sanguíneo desconhecido).
(C) criança é Coombs negativo para D ou Du.
(D) mãe está sensibilizada (Coombs positivo para D ou Du).
(E) dose individual de Rho-Gam foi submetida à prova cruzada, for compatível.
- 35) Alguns recém-nascidos de alto risco podem necessitar de oxigênio suplementar para a prevenção ou correção da hipóxia. Segundo KENNER (2001), o objetivo da terapia suplementar de oxigênio é manter a pressão parcial de oxigênio arterial (PaO₂) de:
- (A) 80 a 100 mmHg
(B) 70 a 90 mmHg
(C) 60 a 80 mmHg
(D) 50 a 70 mmHg
(E) 40 a 60 mmHg

- 36) Em relação à cefaleia pós-punção lombar, é INCORRETO afirmar que:
- (A) é a complicação mais comum da punção lombar, ocorrendo em 15 a 30% dos pacientes submetidos ao procedimento.
 - (B) apresenta-se de forma pulsátil, bifrontal ou occipital, com natureza surda e profunda, causada pela produção excessiva de líquor, de caráter compensatório.
 - (C) pode ser evitada se o paciente permanecer em decúbito ventral depois do procedimento.
 - (D) é geralmente tratada com repouso no leito, drogas analgésicas e hidratação.
 - (E) pode-se usar a técnica do adesivo sanguíneo epidural; ocasionalmente, em casos mais persistentes após tratamento.
- 37) A vacinação será contraindicada quando o paciente apresentar
- (A) desnutrição.
 - (B) afecções das vias aéreas superiores.
 - (C) antecedente familiar de convulsão.
 - (D) doenças agudas febris graves.
 - (E) vacinação contra raiva em andamento.
- 38) De acordo com o Ministério da Saúde, a captação precoce de gestantes para a primeira consulta de pré-natal deve ser realizada em até quantos dias?
- (A) 180
 - (B) 150
 - (C) 120
 - (D) 90
 - (E) 60
- 39) Segundo WONG (2006), num plano de cuidados de enfermagem para uma criança inconsciente, com diagnóstico de enfermagem de risco de lesão relacionada à imobilidade física, depressão sensorial e problema intracraniano, qual a intervenção de enfermagem correta para manter a pressão intracraniana (PIC) estável?
- (A) Manter a cabeceira abaixada para evitar cefaleia.
 - (B) Virar o paciente de um lado para o outro para prevenir o acúmulo de líquido cefalorraquidiano.
 - (C) Realizar a manobra de Valsalva.
 - (D) Prevenir a constipação intestinal.
 - (E) Realizar os procedimentos respiratórios de aspiração e percurssão.

- 40) O aleitamento materno é contraindicado para a mãe
- (A) hipertensa em uso de metildopa.
 - (B) portadora do HIV/HTLV em uso de anti-retroviral.
 - (C) diabética em uso de insulina.
 - (D) em tratamento com tuberculostáticos.
 - (E) em tratamento com cefalosporinas.
- 41) Assinale a opção INCORRETA em relação a métodos de precaução.
- (A) Ao adotar a precaução de disseminação por gotículas, quando o quarto privativo não estiver disponível, a distância entre o paciente infectado e os demais deve ser, no mínimo, de 1,20 m.
 - (B) Nas precauções de disseminação por contato, materiais como termômetro, aparelho de pressão e estetoscópio devem ser individuais. Caso isso não seja possível, devem ser desinfetados antes de serem usados com outro paciente.
 - (C) As medidas de precauções específicas devem ser utilizadas sempre em associação com as precauções básicas.
 - (D) Nas precauções por disseminação aérea, o paciente, quando transportado, deve usar máscara N95.
 - (E) Nas precauções de disseminação por gotículas, a máscara cirúrgica deve ser usada por quem se aproximar do paciente, a uma distância de 1 metro.
- 42) De acordo com a Resolução da ANVISA - RDC 306, de dezembro de 2004, é considerado resíduo do grupo A:
- (A) produtos hormonais.
 - (B) resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.
 - (C) resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração.
 - (D) reveladores.
 - (E) resíduos contendo metais pesados.

- 43) Correlacione a forma de apresentação dos componentes antigênicos às respectivas vacinas, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

APRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES ANTIGÊNICOS	VACINAS
I - Suspensão de bactérias vivas atenuadas	() Poliomielite () Hepatite B
II - Vírus vivos atenuados	() BCG
III - Vírus inativados	() Sarampo
IV - Frações de vírus	() Raiva () Febre Amarela

(A) (IV) (II) (III) (I) (III) (I)
(B) (III) (II) (I) (IV) (IV) (II)
(C) (II) (IV) (I) (II) (III) (II)
(D) (I) (III) (IV) (I) (II) (I)
(E) (III) (II) (I) (II) (IV) (III)

- 44) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

_____ é o termo empregado para indicar a relação do eixo longitudinal do feto com o eixo longitudinal da mãe. Esse termo pode ser _____ ou _____.

- (A) Apresentação / cefálica / pélvica
(B) Atitude / longitudinal / transversal
(C) Situação / cefálica / pélvica
(D) Atitude / cefálica / pélvica
(E) Situação / longitudinal / transversal

- 45) Segundo a Resolução do COFEN nº 311/2007, conforme o que determina o artigo 18, da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, o enfermeiro está sujeito à suspensão do exercício profissional. Essa suspensão consiste na proibição do exercício da profissão da enfermagem por um período não superior a quantos dias?

- (A) 29
(B) 39
(C) 49
(D) 69
(E) 79

- 46) A toxemia gravídica é uma doença da última metade da gestação que se caracteriza por:
- (A) hipotensão, diabetes e infecção urinária.
(B) hipertensão, edema e proteinúria.
(C) hipertensão, edema e oligúria.
(D) hipotensão, aumento de peso e cetonúria.
(E) hipertensão, cefaleia e disúria.
- 47) Segundo BRUNNER (2009), em relação à administração de sangue e hemoderivados é correto afirmar que:
- (A) Na incompatibilidade do sangue do doador com o do receptor a hemólise mais rápida ocorre na incompatibilidade Rh.
(B) As reações transfusionais hemolíticas agudas são evitáveis através da atenção meticulosa nos detalhes da rotulagem das amostras e identificação exata do receptor.
(C) Na transfusão de plaquetas deve-se infundir cada unidade lentamente, observando o paciente quanto a efeitos adversos.
(D) Na transfusão de papa de hemácias a coloração anormal pode constituir sinal de crescimento bacteriano.
(E) A reação febril não-hemolítica é o tipo mais raro de reação transfusional, causada por anticorpos para os leucócitos doadores.
- 48) Segundo KAPLAN (1998), assinale a opção que apresenta três efeitos adversos durante o uso da gabapentina.
- (A) Sonolência, ataxia e dipsia.
(B) Sonolência, ataxia e nistagmo.
(C) Ataxia, fadiga e polidipsia.
(D) Sonolência, náusea e diplopia.
(E) Ataxia, náusea e nistagmo.
- 49) Segundo TAYLOR (1992), a cocaína e o crack agem diretamente sobre o córtex cerebral e, inicialmente, causam:
- (A) aumento da sensação de bem-estar mental e físico.
(B) sensação de depressão e morte.
(C) aumento da sensação de bem-estar e euforia.
(D) aumento da sensação de bem-estar e riso fácil.
(E) sensação de depressão e angústia.

- 50) Segundo o Ministério da Saúde (MS), o planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil. Em relação às razões para esta redução é INCORRETO afirmar que esse planejamento
- (A) diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
 - (B) possibilita a realização de cesáreas para fazer a ligadura tubária.
 - (C) diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e o acesso a outros métodos anticoncepcionais.
 - (D) aumenta o intervalo interpartal, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que os bebês sejam adequadamente amamentados.
 - (E) possibilita a prevenção e/ou postergação de gravidez em mulheres.